

نامه به سردبیر:

در راستای پاسخ به سؤالات مطرح شده در مورد مقاله‌ی تأثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر پیامد مادری زنان باردار (یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده)

رقیه رحمانی بیلنندی^۱- علی عالمی^۲- سید بهنام مظلوم^۳

پیامد زایمان می باشند و این موضوع در مطالعات قبلی به اثبات رسیده است (۱).

توجه به این موضوع نیز حائز اهمیت می باشد که فرد مراقبت کننده (که همان پژوهشگر اصلی مطالعه نیز بوده است) در بیماران دو گروه مداخله و شاهد در تمامی مراحل زایمان حضور داشته، معاینات و ثبت نتایج مرتبط بـا عوامل مورد مطالعه توسط وی انجام می شده است. از این رو در این مطالعه می توان این گونه ادعا نمود که در مقایسه با مطالعاتی که تعداد زیادی عامل زایمان مسؤول بررسی و معاینات و ثبت مشخصات نمونه های پژوهش می باشند، اثر عامل زایمان کنترل شده است. شاید بتوان این موضوع را در زمرة ای نکات مهم این مطالعه به شمار آورد. درباره ای انجام کورسازی روی نمونه های پژوهش باید گفت در این گونه مطالعات احتمال وجود همزمان نمونه های گروه های مداخله و شاهد در بخش و زایشگاه وجود دارد. از طرفی معمولاً فرآیند پیش و حین زایمان تا حدودی طولانی می باشد و مداخلات مورد نظر مطالعه، همچنین ناشتا نگه داشتن نمونه های گروه شاهد در طول این مدت انجام می شده است. با توجه به نکات فوق و هوشیار بودن مادران باردار در طول این مدت، به نظر می رسد امکان انجام کورسازی کامل در مورد نوع مداخله روی نمونه های پژوهش وجود نداشته است. با توجه به این که نگارش این مقاله بر اساس طرح پژوهشی مقطع کارشناسی ارشد نویسنده ای اول بوده است، انجام تحلیل های آماری مرتبط می باشد توسط خود پژوهشگر انجام می شده، بنابراین امکان کورسازی تحلیل گر داده ها نیز ممکن نبوده است.

سردبیر محترم مجله‌ی افق دانش:

سؤالاتی در قالب نامه به سردبیر در مورد مقاله‌ی با عنوان تأثیر دریافت مواد غذایی در طول زایمان بر پیامد مادری زنان باردار توسط همکاران محترم آقایان محسن دهقانی و دکتر قاسم یادگارفر ارسال شده است. ضمن تشکر از نظرات علمی و دقت پژوهشگران محترم، نکات ذیل به استحضار می رسد:

نظر همکاران محترم درباره ای اطلاعات مورد نیاز برای ارائه در جدول ۱ منطقی می باشد. ارائه ای میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی، همچنین تعداد و درصد برای متغیرهای کیفی مسلمان اطلاعات بیشتری در اختیار خوانندگان مقاله قرار می دهد. البته باید توجه داشت که برای بیان نتایج متغیرهای کمی و کیفی مورد استفاده در این مطالعه نیاز به طراحی جداول با حجم بالا و متعددی بود که این به ذوبه ای خود می توانست موجب پیچیدگی نتایج ارائه شده و سردرگمی خوانندگان محترم شود. بنابراین محققین در مقاله ای خود سعی در خلاصه سازی جداول داشته اند. ضمن تشکر از پیشنهاد بجای همکاران محترم، جدول ۱ نشان دهنده ای اطلاعات مورد نظر می باشد.

درباره ای انجام کورسازی برای مشاهده گر، بیمار و تحلیل گر باید به این نکته توجه نمود که در این مطالعه و در اکثر مطالعاتی که در ارتباط با زایمان انجام می شود، امکان کورسازی مشاهده گر به طور کامل وجود ندارد. زیرا عامل زایمان (که در این مطالعه همان مشاهده گر و مراقبت کننده از مادر باردار در حین زایمان بوده است) و چگونگی حمایت های وی از مادر باردار عوامل مؤثری بر

۱- نویسنده ای مسؤول؛ مریمی، کارشناس ارشد مامایی، دانشکده ای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 0533-7223028 نامبر: 0533-7223814 پست الکترونیکی: roghaierehrahmany@yahoo.com

2- پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گلباش، دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- کارشناس ارشد آمار، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

می‌رفت احتمال تأثیر مخدوش کننده‌ها تا حد ممکن کنترل شده باشند. با این حال و بر اساس پیشنهاد همکاران گرامی، ابتدا مدل رگرسیون تک متغیره روی هر متغیر مستقل به طور جداگانه برآراش داده شد. سپس متغیرهایی که سطح معنی داری آن‌ها زیر 0/2 بود، وارد مدل رگرسیون چندگانه شدند (4). جدول 2 نتایج مربوط به آنالیز رگرسیون تک متغیره و چندگانه را نشان می‌دهد. با توجه به نتایج فوق، بین طول مرحله‌ی دوم زایمان نمونه‌ها در گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد ($p=0/056$) و نتیجه‌ای که در مقاله‌ی اصلی گزارش شده، می‌تواند ناشی از اثر مخدوش کننده‌ی متغیرهای همچون تعداد زایمان قبلی و سن بارداری بوده باشد.

در خاتمه ضمن سپاس مجدد از همکاران محترم، امیدواریم در محیط‌های علمی-پژوهشی و دانشگاهی بیش از پیش شاهد شکوفایی گفتمان علمی بر پایه‌ی نقد و بررسی عالمانه باشیم.

البته در این مطالعه نمونه‌ها به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد تخصیص داده شده‌اند و تخصیص تصادفی معمولاً با هدف کنترل سوگیری‌های آگاهانه و ناگاهانه و ایجاد گروه‌های قابل مقایسه‌ی بیماران با ویژگی‌های مشابه انجام می‌شود (2).

همان گونه که می‌دانیم، اثرات مخدوش کننده‌ی یکی از معمول ترین دلایل تحریف نتایج در کارآزمایی‌های بالینی می‌باشد. همکاران محترم در نامه‌ی خود برای کنترل اثر متغیرهای مخدوش گر احتمالی، برآزدن مدل رگرسیونی را پیشنهاد داده‌اند. اگرچه یکی از روش‌های کنترل این گونه متغیرها، مدلسازی می‌باشد، اما همان گونه که می‌دانیم در کارآزمایی‌های بالینی تخصیص تصادفی مواجهه خطر مخدوش کننده‌ی را کاهش می‌دهد. علت این امر توزیع تصادفی مخدوش کننده‌ها (شناسنخته شده و ناشناسنخته) در گروه‌های مداخله و شاهد ذکر شده است (2-3). در این مطالعه این کار انجام شده و انتظار

جدول 1: مشخصات دموغرافیک و مامایی واحدهای پژوهش در دو گروه مداخله و شاهد

نام متغیر	گروه	مداخله	کنترل
سن - میانگین (انحراف معیار)	(4/1) /25/4	(3/7) 26/8	
تعداد حاملگی - میانگین (انحراف معیار)	(0/8) 1/9	(1/0) 2/0	
تعداد زایمان - میانگین (انحراف معیار)	(0/8) 0/9	(0/9) 0/9	
تعداد سقط - میانگین (انحراف معیار)	(0/3) 0/1	(0/4) 0/1	
سن حاملگی (هفتاه) - میانگین (انحراف معیار)	(0/8) 38/5	(1/0) 39/0	
نمايه‌ی تولدی بدنی - میانگین (انحراف معیار)	(2/4) 28/2	(2/5) 28/8	
دیلاتاسیون سرویکس هنگام پذیرش - میانگین (انحراف معیار)	(0/7) 2/6	(0/7) 2/7	
دیلاتاسیون سرویکس هنگام پارگی کیسه‌ی آب	(0/9) 4/5	(0/9) 4/7	
اکسی توسین (IU) - میانگین (انحراف معیار)	(1/2) 2/8	(1/2) 3/1	
مایع وریدی (CC) - میانگین (انحراف معیار)	(129/4) 401/5	(126/6) 472/2	
وزن نوزاد هنگام تولد (گرم) - میانگین (انحراف معیار)	(262/6) 3119/5	(350/5) 3183	

ادامه‌ی جدول 1: مشخصات دموگرافیک و مامایی واحدهای پژوهش در دو گروه مداخله و شاهد

گروه		نام متغیر
مداخله	کنترل	
(0/0) 0	(2/1) 2	تحصیلات – تعداد (درصد)
(16/1) 14	(18/9) 17	بیسوساد
(14/9) 13	(16/7) 15	ابتدایی
(48/3) 42	(36/7) 33	راهنمایی
(20/7) 18	(25/6) 23	دبیرستان
		دپلم و بالاتر
		شغل – تعداد (درصد)
(81/6) 71	(77/8) 70	خانه دار
(18/4) 16	(22/2) 20	شاغل
		درآمد – تعداد (درصد)
(60/9) 53	(66/7) 60	کاملاً مطلوب
(35/6) 31	(23/3) 21	تا حدی مطلوب
(3/5) 3	(10/0) 9	نامطلوب
		تمایل به حاملگی – تعداد (درصد)
(71/3) 62	(66/7) 60	خواسته
(28/7) 25	(33/3) 30	ناخواسته
		پارگی کیسه‌ی آب – تعداد (درصد)
(6/9) 6	(14/4) 13	خود به خودی
(93/1) 81	(85/6) 77	مصنوعی
		جایگاه سر جنین (موقعیت سر جنین تا خارهای ایسکیمال لگن) تعداد (درصد)
(5/7) 5	(6/7) 6	-2
(48/3) 42	(43/3) 39	-1
(41/4) 36	(40) 36	0
(4/6) 4	(10) 9	+1
		نوع بی دردی – تعداد (درصد)
(6/9) 6	(4/4) 4	عدم استفاده از بی دردی
(2/3) 2	(4/4) 4	انتونوکس
(90/8) 79	(91/2) 82	مخدر
		وضعیت پرینه – تعداد (درصد)
(51/7) 45	(54/4) 49	سالم
(40/2) 35	(38/9) 35	اپی زیاتومی
(8/1) 7	(6/7) 6	پارگی

جدول 2: ارتباط طول مرحله‌ی دوم زایمان با شاخص‌های دموگرافیک و مامایی در دو گروه مداخله و کنترل

نام متغیر	رگرسیون خطی تک متغیره	رگرسیون خطی چندگانه	p-value	beta
سن - میانگین (انحراف معیار)	-1/106	0/001>	0/250	-0/232
تعداد حملات - تعداد (درصد)	3/340	0/001>	0/421	0/595
شغل - تعداد (درصد)	0/982	0/648	-	-
درآمد - تعداد (درصد)	-2/835	0/042	0/901	0/150
تمایل به حاملگی - تعداد (درصد)	3/868	0/038	0/420	-1/313
تعداد حاملگی - میانگین (انحراف معیار)	-7/265	0/001>	0/408	2/538
تعداد زایمان - میانگین (انحراف معیار)	-7/869	0/001>	0/030	-6/521
تعداد سقط - میانگین (انحراف معیار)	-5/259	0/049	0/086	-5/616
سن حاملگی (هفتاه) - میانگین (انحراف معیار)	0/735	0/001>	0/039	0/233
نمایه‌ی توده‌ی بدنی - میانگین (انحراف معیار)	0/192	0/608	-	-
دیلاتاسیون سرویکس هنگام پذیرش - میانگین (انحراف معیار)	-4/328	0/001	0/698	0/435
پارگی کیسه‌ی آب - تعداد (درصد)	2/388	0/393	-	-
دیلاتاسیون سرویکس هنگام پارگی کیسه‌ی آب	-1/003	0/303	-	-
جایگاه سر جنین	4/269	-0/228	0/838	-
اکسی توسمین (IU) - میانگین (انحراف معیار)	5/784	2/093	0/077	-
مایع وریدی (CC) - میانگین (انحراف معیار)	0/052	0/020	0/063	-
نوع بی دردی - تعداد (درصد)	-6/454	0/025	0/726	0/778
وضعيت پرینه - تعداد (درصد)	4/842	0/001>	0/268	-1/287
وزن نوزاد هنگام تولد (گرم) - میانگین (انحراف معیار)	0/006	0/003	0/096	-
تخصیص در گروه‌های مطالعه	-3/687	0/032	0/056	-2/538

References:

- 1- Lindow S, Henddrice MS. The effect of emotional support on maternal oxytocine level in laboring women. Eur J Obstet and Gynecol Report Biol 1998; 79(2): 129-127.
- 2- Chow S, Liu J. Design and analysis of clinical trials: Concepts and methodologies. 2nd ed. New Jersey: Wiley & Sons; 2004.
- 3- Senn S. Statistical issues in drug development. 2nd ed. England: Wiley & Sons; 2007.
- 4- Jewell NP. Statistics for epidemiology. California: Chapman Hall/CRC; 2004.