



Effect of Motivational Interviewing on Physical Activity Intention among Obese and Overweight Women Using Protection Motivation Theory: A Randomized Clinical Trial

ARTICLE INFO

Article Type

Original Research

Authors

Mirkarimi S.K.¹ PhD,
Charkazi A.² PhD,
Honarvar M.R.¹ MSc,
Kabir M.J.¹ PhD,
Berdi Ozouni-Davaji R.¹ MSc,
Aryaei M.* MSc,
Eri M.¹ MSc

How to cite this article

Mirkarimi S.K, Charkazi A,
Honarvar M.R, Kabir M.J, Berdi
Ozouni-Davaji R, Aryaei M, Eri M.
Effect of Motivational
Interviewing on Physical Activity
Intention among Obese and
Overweight Women Using
Protection Motivation Theory: A
Randomized Clinical Trial. *Quarterly
of the Horizon of Medical Sciences.*
2016;22(4):321-327.

ABSTRACT

Aims As a growing problem, obesity is one of the most important worldwide health problems. One of the major factors leading to obesity is the sedentary lifestyle. The aim of this study was to investigate the effects of motivational interviewing on the physical activity intention in the obese or overweight women, using the protection motivation theory (PMT).

Materials & Methods In the clinical trial study, 60 obese or overweight women referred to the health centers of Gorgan were studied in 2015. The subjects, selected via non-probable and available sampling method, were randomly divided into two groups including control and motivational interviewing groups. Data was collected using a researcher-made questionnaire before the intervention and 2 and 6 months after in both groups. Data was analyzed by SPSS 18 software using independent T, Chi-square, repeated measures ANOVA, LSD, and one-variable and multivariable linear regression tests.

Findings The scores of all the constructs of PMT in motivational interviewing group significantly increased 2 and 6 months after the intervention ($p<0.001$) than control group. However, the reductions in the BMI and weight anthropometric indices were not significant 2 and 6 months after the intervention ($p>0.05$). The most powerful constructs predicting the intention towards the physical activities 2 months after the intervention were perceived-replay efficiency, self-efficacy, and perceived intensity, successively. In addition, such factors 6 months after the intervention were attitude and perceived intensity, successively.

Conclusion The motivational interviewing increases the scores of all the constructs of PMT, which leads to an increase in the physical activity intention in the obese or overweight women.

Keywords Motivational Interviewing; Physical Activity; Protection Motivation Theory; Obesity; Overweight

CITATION LINKS

- [1] Association of obesity with the prevalence of hypertension in ... [2] Impact of information about obesity genomics on the stigmatization ... [3] Effect of motivational interviewing on a weight loss program based on the ... [4] The relationship between body image, self-efficacy and ... [5] Prevalence of insufficient physical activity and ... [6] Non communicable disease risk factors in ... [7] Physical inactivity and related factors in an adult Iranian ... [8] Obesity increases risk of declining physical activity over ... [9] A meta-analysis of physical activity in the prevention of coronary heart ... [10] Behavioral treatment of ... [11] Outcomes from a medical weight loss program: primary care clinics versus weight loss ... [12] Review of motivational interviewing in promoting health ... [13] Effect of motivational interviewing on blood pressure of referents suffering from ... [14] Motivational interviewing in health care: Helping patients change ... [15] A multidimensional meta-analysis of treatments for depression, panic, and ... [16] Stress management versus lifestyle modification on systolic hypertension and medication ... [17] Food defense management plan implementation intention: An application of protection motivation ... [18] Using the protection motivation theory to examine the effects of obesity fear arousal on the physical activity of young adult female ... [19] Prevalence of obesity and correlations with lifestyle and dietary factors in ... [20] Effects of motivational interviewing on weight loss of ... [21] Effect of motivational interviewing on ... [22] Predicting changes in physical activity among adolescents: the role of self-efficacy, intention, action planning and coping ... [23] Using a combined motivational and volitional intervention to promote exercise and healthy dietary behaviour among ... [24] The use of the modified protection motivation theory to explore adult consumers' functional foods consumption ... [25] Predicting physical activity ... [26] Predictors of physical activity to prevent osteoporosis based on ... [27] Determinants of physical ... [28] Does changing behavioral intentions engender ... [29] Prediction and intervention in ...

*Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

¹Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

²Public Health School, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

Correspondence

Address: Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Hirkhan Boulevard, Gorgan, Iran

Phone: +981732424377

Fax: +981732421657

aryaem2009@yahoo.com

Article History

Received: December 12, 2015

Accepted: August 1, 2016

ePublished: October 1, 2016

سازه‌های پیش‌بینی کننده قصد انجام فعالیت بدنی در ۲ ماه پس از مداخله به ترتیب کارآبی پاسخ درک شده، خودکارآمدی و شدت درک شده و ۶ ماه پس از مداخله به ترتیب نگرش و شدت درک شده بودند.

نتیجه‌گیری: اجرای مصاحبه انگیزشی، نمره تمام سازه‌های تئوری انگیزش محافظت و متعاقباً قصد انجام فعالیت بدنی را در زنان چاق یا دارای اضافه‌وزن افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: مصاحبه انگیزشی، قصد انجام فعالیت بدنی، تئوری انگیزش محافظت، چاق، اضافه‌وزن

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

*نویسنده مسئول: aryaiem2009@yahoo.com

تأثیر مصاحبه انگیزشی بر قصد انجام فعالیت بدنی در زنان چاق یا دارای اضافه وزن با استفاده از تئوری انگیزش محافظت: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

سیدكمال الدین میرکریمی PhD

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

عبدالرحمان چرکزی PhD

دانشکده پهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

محمد رضا هنوری MSc

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

محمد جواد کبیر PhD

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

رحمان بردی اوزوونی دوجی MSc

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

محمد آریایی MSc*

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

مریم ایری MSc

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

اهداف: چاقی از مشکلات بهداشتی مهم در سراسر دنیا است که به طور روزافزونی در حال افزایش است. سبک زندگی کم تحرک یکی از دلایل عده‌های این مشکل است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر مصاحبه انگیزشی بر قصد انجام فعالیت بدنی در زنان چاق یا دارای اضافه‌وزن با استفاده از تئوری انگیزش محافظت بود.

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۹۴، ۶۰ نفر از زنان چاق یا دارای اضافه‌وزن مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر گرگان به صورت نمونه‌گیری غیراحتمالی و درسترس انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و مصاحبه انگیزشی تقسیم شدند. متغیرهای پژوهش قبل، ۲ و ۶ ماه پس از مداخله، در هر دو گروه توسط پرسشنامه محقق ساخته اندازه‌گیری شد. تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS 18 و توسط آزمون‌های آماری T مستقل، مجدد کای، آنوا با اندازه‌های مکرر، LSD و رگرسیون خطی تک متغیره و چندمتغیره انجام شد.

یافته‌ها: نمره تمام سازه‌های تئوری انگیزش محافظت در گروه مصاحبه انگیزشی در مقایسه با گروه کنترل، ۲ و ۶ ماه بعد از مداخله افزایش معنی‌دار یافت ($p < 0.001$)، اما کاهش شاخص‌های آنتروپومتریک وزن و شاخص توده بدنی در ۲ و ۶ ماه بعد، معنی‌دار نبود ($p > 0.05$). قوی ترین

شیوع چاقی به عنوان یک معضل بهداشتی در سراسر جهان افزایش یافته و طی سال‌های اخیر به یک اپیدمی تبدیل شده است^[1]. براساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، در حدود ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به چاقی مبتلا هستند^[2]. شیوع چاقی و اضافه‌وزن در ایران ۲۲٪ است. زنان در مقایسه با مردان، شانس بیشتری برای ابتلا به چاقی دارند^[3]. مشکلات چاقی و اضافه‌وزن شامل فشار خون در دوران بارداری، دیابت، ترومبوامبولیسم، برخی سلطان‌ها مانند سلطان سینه، مری، کولورکتال و دهانه رحم است^[3].

کم تحرکی یکی از دلایل عده‌های چاقی است. کاهش عوامل خطر قبل تغییر مانند رژیم غذایی ناسالم و کم تحرک تا ۸۰٪ می‌تواند خطر مرگ و میر زور درس ناشی از بیماری‌های قلبی - عروقی را کاهش دهد^[4]. براساس تخمین‌های سازمان جهانی بهداشت در حدود ۳۱٪ افراد بالای ۱۵ سال، کم تحرک هستند^[5]. برآورد می‌شود تقریباً ۷۰-۸۰٪ جمعیت ایران سبک زندگی کم تحرک دارند^[6]. سطح پایین فعالیت بدنی بهویژه با میزان بروز چاقی در ارتباط است^[7]. در یک مطالعه متانالیز روی ۱۲۰۸۷۷ مرد و زن آمریکایی در یک دوره چهارساله، افرادی که فعالیت بدنی بیشتری داشتند در مقایسه با افراد کم تحرک، ۱/۸ پوند، وزن کمتری گرفتند^[8]. برلين و کودتیتر در یک مطالعه متانالیز نشان دادند که زندگی بی تحرک در مقایسه با شیوه زندگی فعل، با ۱/۹ برابر افزایش در خطر نسبی مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی - عروقی مرتبط است^[9].

پیشگیری و درمان اضافه‌وزن و چاقی به عنوان یک چالش چندبعدی تهدیدکننده سلامتی نیازمند همکاری و اقدامات در سطح سیاستگذاران تا سطح فردی است. بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که برنامه‌های کارآمد کاهش وزن، عمدتاً مبتنی بر کلینیک بوده و از طریق آموزش‌های چهره‌به‌چهره و جلسات هفتگی انجام می‌شوند^[10, 11].

پیگیری ۲ و ۶ ماه بعد از مداخله، به ترتیب ۲ نفر در گروه کنترل و یک نفر در گروه مصاحبه انگیزشی بهدلیل عدم تمایل به ادامه همکاری در پژوهش از مطالعه خارج شدند.

برای هر دو گروه (کنترل و مصاحبه انگیزشی)، جلسات آموزشی مربوط به فعالیت بدنی (فواید و تاثیرات آن در چاقی و اضافه وزن) طی ۲ هفته، هر هفته ۲ جلسه (هر جلسه ۴۵ دقیقه تا یک ساعت) توسط یک نفر متخصص آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ارایه شد. مصاحبه انگیزشی گروهی نیز توسط یک نفر متخصص در رشته مشاوره طی ۵ جلسه (هر جلسه یک ساعت طی ۲ هفته) ارایه شد که در هر جلسه ۸-۱۰ نفر حضور داشتند. در هر دو گروه (کنترل و مصاحبه انگیزشی) از لیفلت طراحی شده مبتنی بر تئوری PMT با محتوای فواید و تاثیرات فعالیت بدنی بر چاقی و اضافه وزن استفاده شد. اعتبار این پمبلت توسط ۳ نفر متخصص آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و ۲ نفر متخصص تربیت بدنی مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

متغیرهای مورد مطالعه از قبیل سازه‌های تئوری، قصد و نگرش نسبت به فعالیت بدنی و وضعیت آنتروپومتریک، قبل از مداخله و ۲ و ۶ ماه پس از مداخله، در هر دو گروه اندازه‌گیری شد.

به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته ۸ قسمتی مبتنی بر سازه‌های تئوری PMT شامل اطلاعات دموگرافیک، آنتروپومتریک، حساسیت درکشده، شدت درکشده، خودکارآمدی، کارآبی پاسخ درکشده و قصد و نگرش نسبت به انجام فعالیت بدنی استفاده شد. تمام سئوالات مربوط به سازه‌های تئوری براساس لیکرت پنج‌درجه‌ای از کاملاً موافق (با نمره ۵) تا کاملاً مخالف (با نمره یک) نمره‌گذاری شدند. روایی صوری پرسشنامه توسط ۴ نفر متخصص آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و ۲ نفر متخصص تغذیه بررسی و تایید شد. روایی محتوایی پرسشنامه نیز توسط ۵ نفر متخصص آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، ۲ نفر متخصص تغذیه و ۷ نفر از زنان مورد بررسی و تایید قرار گرفت. مقدار پایابی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و همسانی درونی محاسبه شد و مقدار آن برای سئوالات نگرش نسبت به فعالیت بدنی ۷۲/۰، حساسیت درکشده ۰/۸۳، شدت درکشده ۰/۸۵، خودکارآمدی ۰/۸۷، کارآبی پاسخ درکشده ۰/۷۳ و برای سئوالات قصد ۰/۹۴ بدست آمد.

وزن با حداقل لباس و بدون کفش با ترازو مدل ۸۰۳ (Seca؛ آلمان) و با دقت ۱/۰ کیلوگرم اندازه‌گیری شد. قد یکبار در ابتدای تحقیق در حالت ایستاده، طوری که پشت سر، شانه‌ها، باسن و پاشنه پا از پشت مماس با دیوار باشد با قدستج دیواری (Seca؛ آلمان) با دقت ۱/۰ متر اندازه‌گیری شد. تمامی اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک توسط یک نفر انجام گرفت.

توزیع داده‌های به‌دست‌آمده براساس آزمون شاپیرو-ولیک نرمال بود. متغیرهای کمی در سطح پایه (پیش از مداخله)، با آزمون آماری

اصحابه انگیزشی، روشی مراجعه محور و مستقیم به‌منظور افزایش انگیزه درونی افراد برای تغییر رفتار از طریق بررسی و حل ابهامات است که نتایج سودمند آن در زمینه سلامت به‌طور گستره‌های مورد تایید قرار گرفته است^[12]. اثربخشی روش‌های سنتی تغییر رفتار در خصوص بیماری‌های مزمن که نیازمند تغییر سبک زندگی هستند، رضایت‌بخش نیست^[13]. به عنوان مثال، تنها ۳۰٪ بیماران فشارخونی با روش‌های سنتی، بیماری خود را کنترل کردند^[14]. در مطالعه دیگر، ۵۰٪ افراد شرکت کرده در برنامه فعالیت بدنی در مدت ۶ ماه دست از فعالیت بدنی کشیدند^[15] و تنها ۲۵٪ افراد شرکت کننده در مطالعه پس از ۱۸ ماه به کاهش وزن مناسب دست یافتند^[16].

تئوری انگیزش محافظت (PMT)، مدلی از ارزیابی ترس به‌منظور پیش‌بینی و ترغیب افراد به انجام رفتارهای سالم است^[17]. مطالعات نشان داده‌اند که این تئوری، پیش‌بینی کننده مناسبی برای رژیم غذایی^[17] و فعالیت بدنی^[18] است. براساس مطالعات انجام شده، مطالعه‌ای با عنوان مشابه در ایران انجام نشده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مصاحبه انگیزشی بر قصد انجام فعالیت بدنی در زنان چاق یا دارای اضافه وزن با استفاده از تئوری PMT انجام شد.

مواد و روش‌ها

این کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۹۴ روی ۶۰ نفر از زنان چاق یا دارای اضافه وزن مراججه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در شهر گرگان انجام شد. کلیه نمونه‌ها در مرحله اول به صورت نمونه‌گیری غیراحتمالی و در دسترس انتخاب شدند؛ به این صورت که شاخص توده بدنی (BMI) ۲۵-۳۰ کیلوگرم بر متر مربع افراد دارای اضافه وزن و شاخص توده بدنی بالاتر از ۳۰ کیلوگرم بر متر مربع افراد چاق در نظر گرفته شدند^[19]. از میان ۶ مرکز بهداشتی درمانی شهری در گرگان، دو مرکز به صورت تصادفی انتخاب شد. به‌منظور کاهش سوگیری انتخاب، نمونه‌های گروه کنترل و گروه مصاحبه انگیزشی از دو مرکز بهداشتی درمانی متفاوت انتخاب شدند و زنان انتخاب شده براساس معیار BMI. به‌طور تصادفی به دو گروه تخصیص داده شدند. به‌منظور تعیین حجم نمونه، با توجه به مطالعه نویلیان و همکاران^[20] و میانگین خودکارآمدی ۵۷/۹۰±۳۴/۹۰ در گروه مصاحبه انگیزشی و میانگین ۴۴/۰۶±۸/۶۸ در گروه کنترل در سطح اطمینان ۹۵٪ و توان آزمون ۹۵٪ تعداد ۳۰ نمونه برای هر گروه در نظر گرفته شد.

معیارهای ورود به مطالعه شامل تمایل به شرکت در مطالعه و سعادت خواندن و نوشتن و معیارهای خروج از مطالعه شامل غیبت بیش از یک جلسه (در جلسات مصاحبه انگیزشی و آموزش در خصوص فعالیت بدنی) و عدم تمایل فرد به ادامه همکاری در مطالعه بود. از زنان رضایت‌نامه کتبی آگاهانه شرکت در مطالعه اخذ شد. در زمان

وضعیت شغلی با هم تفاوت معنی‌داری نداشتند ($p > 0.05$ ؛ جدول ۱).

جدول ۱) توزیع فراوانی مطلق و نسبی (اعداد داخل پرانتز درصد هستند) برخی مشخصات دموگرافیک شرکت‌کنندگان در دو گروه کنترل و مصاحبه انگیزشی (تعداد در هر گروه = ۳۰ نفر)

شاخص		گروه کنترل	گروه مصاحبه انگیزشی	وضعیت شغلی
(۶۶/۷) ۲۰	(۵۶/۷) ۱۷	کارمند		
	(۲۶/۷) ۸	بی‌کار		
	(۱۶/۷) ۵	سایر		
سطح تحصیلات				
(۱۳/۲) ۴	(۲۳/۳) ۷	راهنمایی		
(۳۳/۳) ۱۰	(۲۶/۷) ۸	متوسطه		
(۵۳/۳) ۱۶	(۵۰/۰) ۱۵	دانشگاهی		
وضعیت تأهل				
(۱۶/۷) ۵	(۲۰/۰) ۶	مجرد		
(۸۳/۳) ۲۵	(۸۰/۰) ۲۴	متاهل		

جدول ۲) مقایسه میانگین آماری نمرات سازه‌های تئوری انگیزش محافظت، قصد و نگرش اشخاص‌های آنتروپومتریک در گروه‌های کنترل و مصاحبه انگیزشی در قبل از مداخله و ۲ و ۶ ماه بعد از مداخله

شاخص	پیش از مداخله	۲ ماه بعد از مداخله	۶ ماه بعد از مداخله	حساسیت در کشیده
گروه کنترل	۹۰/۲۸±۱۱/۷۷**	۹۱/۷۸±۱۲/۱۰*	۹۱/۷۸±۱۲/۱۰*	شدت در کشیده
	۱۰۹/۰۷±۱۱/۱۴**	۹۰/۸۶±۱۴/۷۱*	۹۰/۸۶±۱۴/۷۱*	گروه مصاحبه انگیزشی
گروه کنترل	۹۳/۷۱±۱۲/۲۲**	۹۳/۴۶±۱۲/۶۹*	۹۳/۴۶±۱۲/۶۹*	گروه مصاحبه انگیزشی
	۱۱۴/۷۲±۱۰/۵۱**	۹۳/۵۵±۱۵/۰۸*	۹۳/۵۵±۱۵/۰۸*	گروه مصاحبه انگیزشی
گروه کنترل	۲۹/۲۱±۸/۱۷**	۲۱/۰۳±۷/۲۵*	۲۱/۰۳±۷/۲۵*	خودکارآمدی در کشیده
	۳۷/۵۵±۷/۴۴**	۲۲/۱۳±۷/۴۴*	۲۲/۱۳±۷/۴۴*	گروه مصاحبه انگیزشی
گروه کنترل	۲۳/۵۷±۶/۱۱**	۱۷/۲۱±۵/۱۵*	۱۷/۲۱±۵/۱۵*	کارآبی پاسخ در کشیده
	۳۰/۵۱±۵/۳۶**	۱۷/۰۳±۴/۸۵*	۱۷/۰۳±۴/۸۵*	گروه مصاحبه انگیزشی
گروه کنترل	۶/۱۷±۱/۸۰**	۴/۰۰±۱/۴۰*	۴/۰۰±۱/۴۰*	قصد انجام فعالیت بدنی
	۸/۳۷±۱/۱۴**	۴/۳۷±۱/۶۵*	۴/۳۷±۱/۶۵*	گروه مصاحبه انگیزشی
گروه کنترل	۲۱/۸۳±۴/۸۱**	۲۱/۷۸±۵/۲۴*	۲۱/۷۸±۵/۲۴*	نگرش انجام فعالیت بدنی
	۲۳/۱۵±۴/۲۷**	۲۱/۱۳±۵/۳۰*	۲۱/۱۳±۵/۳۰*	گروه مصاحبه انگیزشی
گروه کنترل	۷۲/۹۸±۶/۵۳	۷۴/۷۰±۷/۳۵	۷۴/۷۰±۷/۳۵	وزن (کیلوگرم)
	۷۳/۸۹±۶/۵۴	۷۶/۲۲±۷/۰۶	۷۶/۲۲±۷/۰۶	گروه مصاحبه انگیزشی
گروه کنترل	۲۷/۷۷±۲/۲۱	۲۸/۳۹±۲/۳۵	۲۸/۳۹±۲/۳۵	شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)
	۲۷/۷۵±۱/۷۱	۲۷/۷۵±۱/۷۲	۲۸/۵۸±۱/۸۴	گروه مصاحبه انگیزشی

* اختلاف معنی‌دار ۲ و ۶ ماه بعد از مداخله با پیش از مداخله؛ ** اختلاف معنی‌دار ۶ ماه بعد از مداخله با ۲ ماه بعد از مداخله

T مستقل و متغیرهای کیفی با آزمون آماری مجدد کای مقایسه شدند. از آزمون آنوا با اندازه‌های مکرر برای بررسی داده‌های آنتروپومتریک (وزن و شاخص توده بدنی) و سازه‌های تئوری در ۲ و ۶ ماه بعد از مداخله استفاده شد. همچنین آزمون LSD بهمنظور مقایسه روند زمانی بهصورت دو به دو در گروه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. بهمنظور بررسی پیش‌بینی اثرات سازه‌ها بر قصد افراد برای انجام فعالیت بدنی، از مدل رگرسیون خطی استفاده شد، بهطوری که متغیرها با سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ در مدل تکمتغیره، وارد مدل رگرسیون چندمتغیره شدند و تاثیر آنها (بهروش بکوارد) مورد ارزیابی قرار گرفت. کلیه تجزیه و تحلیل‌ها توسط نرم‌افزار آماری SPSS 18 انجام شد.

یافته‌ها

میانگین سنی زنان مورد مطالعه در گروه کنترل $۳۸/۷۲\pm ۹/۵۳$ سال و در گروه مصاحبه انگیزشی $۳۷/۲۰\pm ۸/۰۸$ سال بود. دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک سن، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل و

مطالعه‌ای مرتبط، می‌تواند دریافت آموزش در گروه کنترل باشد که با نتایج مطالعه حاضر هم‌خوانی دارد^[۱۳]. یافته‌های مطالعه حاضر نشان‌دهنده تاثیر طولانی‌مدت مصاحبه انگیزشی به عنوان یک تکنیک مناسب تغییر قصد رفتار است که اثربخشی آن در بسیاری از مطالعات به اثبات رسیده است^[۲۳-۲۱].

قوی‌ترین سازه‌های پیش‌بینی‌کننده قصد زنان برای انجام فعالیت بدنی (۲ ماه پس از مداخله) به ترتیب کارآیی پاسخ درکشده، خودکارآمدی و شدت درکشده بودند. در مطالعه دیگر نیز دو سازه کارآیی پاسخ و خودکارآمدی درکشده مهم‌ترین سازه‌های پیش‌بینی‌کننده افراد برای غذای‌های صنعتی بودند^[۲۴] که در راستای نتایج کنونی است. در اغلب مطالعات انجام‌شده، خودکارآمدی از مهم‌ترین سازه‌های انجام فعالیت بدنی بوده است^[۲۵]. در یک مرور سیستماتیک و متأالیک، خودکارآمدی از مهم‌ترین سازه‌های پیش‌بینی‌کننده انجام فعالیت بدنی بود^[۲۷]. کارآیی پاسخ درکشده نیز ماهیتی تقریباً یکسان با خودکارآمدی دارد، لذا قدرت پیش‌بینی‌کنندگی آن نیز می‌تواند قابل انتظار باشد.

یافته قابل تأمل مطالعه، قدرت پیش‌بینی‌کنندگی نگرش برای قصد انجام فعالیت بدنی با گذشت ۶ ماه از مداخله بود. دلیل آن می‌تواند این موضوع باشد که در گروه مصاحبه انگیزشی، شرکت‌کنندگان از یکدیگر بازخورد می‌گرفتند و این جلسات در قالب گروه‌های ۱۰-۱۱ نفره اجرا می‌شد که ساختاری مشابه جلسات بحث گروهی دارد که احتمال تغییر نگرش در چنین جلساتی بیشتر است. سازه درکشده، تنها سازه پیش‌بینی‌کننده قصد انجام فعالیت بدنی، ۲ و ۶ ماه بعد از مداخله بود که مشابه مطالعات دیگر^[۲۳] با روش اجرا و متغیرهای مشابه (فعالیت بدنی و رژیم غذایی) است. با این وجود سازه شدت درکشده در مطالعه حاضر در مقایسه با سایر سازه‌ها قدرت پیش‌بینی‌کنندگی کمتری دارد و دلیل آن می‌تواند این باشد که این سازه عمدتاً متوجه عالیم بالینی بیماری‌ها است، در حالی که در مطالعه کنونی قصد انجام رفتار بررسی شده است.

اگر چه متغیرهای وزن و شاخص توده بدنی، ۲ و ۶ ماه بعد از مداخله در هر دو گروه کاهش یافتند، اما این اختلاف معنی‌دار نبود. این یافته‌ها با نتایج مطالعات دیگر^[۲۱]،^[۲۳] متفاوت است. براساس مطالعات مختلف، بروز تغییرات قصد با اندازه متوسط تا زیاد منجر به تغییرات رفتار با اندازه کم تا متوسط می‌شود^[۲۸]. بنابراین حتی اگر فردی به طور موققت‌آمیزی قصد فرد دیگری را در زمینه اجتناب از مصرف مواد غذایی تغییر دهد (و این تغییر با اندازه متوسط تا زیاد باشد)، انتظار می‌رود رفتار او به‌مقدار کمتری تغییر کند. تغییر سازه‌های تئوری انگیزش محافظت، قصد افراد را در مقایسه با مداخله انگیزشی صرف، بیشتر تحت الشاعع قرار می‌دهد^[۲۹]. از آنجا که ما در این مطالعه نیز قصد انجام فعالیت بدنی را مطالعه کردیم و نه فعالیت بدنی را، بنابراین معنی‌دار نشدن تاثیر مصاحبه انگیزشی بر شاخص‌های آنتروپومتریک چندان دور از انتظار نیست. همچنین با

پس از اجرای مصاحبه انگیزشی، نمره تمام سازه‌های تئوری PMT در گروه مصاحبه انگیزشی در مقایسه با گروه کنترل، ۲ و ۶ ماه بعد از مداخله افزایش معنی‌دار یافت ($p<0.001$) که این افزایش برای سازه‌های حساسیت درکشده٪ ۳۵، شدت درکشده٪ ۳۶ خودکارآمدی٪ ۲۴، کارآیی پاسخ درکشده٪ ۳۶، قصد٪ ۳۹ و نگرش٪ ۲۲ بود. اگر چه شاخص‌های آنتروپومتریک وزن و شاخص توده بدنی در ۲ و ۶ ماه بعد، کاهش یافته بودند، اما این کاهش از نظر آماری معنی‌دار نبود ($p>0.05$: جدول ۲).

رونده زمانی بر سازه‌های تئوری انگیزش محافظت تاثیر معنی‌داری داشت و منجر به افزایش نمره تمام سازه‌ها شد و همچنین باعث کاهش شاخص‌های آنتروپومتریک وزن و BMI در هر دو گروه شد که معنی‌دار نبود.

۲ ماه پس از اجرای مداخله، سه سازه شدت درکشده ($p=0.14$ ، $\beta=0.22$)، کارآیی پاسخ درکشده ($p=0.001$ ، $\beta=0.39$) و خودکارآمدی درکشده ($p=0.03$ ، $\beta=0.73$) و ۶ ماه پس از اجرای مداخله، دو سازه شدت درکشده ($p=0.20$ ، $\beta=0.20$) و نگرش نسبت به انجام فعالیت بدنی ($p=0.001$ ، $\beta=0.72$) به طور معنی‌داری قصد زنان برای انجام فعالیت بدنی را پیش‌بینی کردند.

بحث

هدف اولیه در مطالعه حاضر، بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر سازه‌های تئوری و در نهایت قصد انجام فعالیت بدنی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری گرگان و هدف ثانویه آن، بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر متغیرهای آنتروپومتریک وزن و BMI بود.

در این مطالعه، نمره تمام سازه‌های تئوری انگیزش محافظت در هر دو گروه کنترل و مصاحبه انگیزشی افزایش یافته بود و بین دو گروه از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود داشت. افزایش نمره سازه‌ها در گروه کنترل نیز تا حدودی قابل قبول است، زیرا این گروه نیز آموزش‌هایی را با استفاده از روش سخنرانی و پیمایش دریافت نموده است. در مطالعه دیگری در گرگان نمره سازه‌های تئوری در گروه کنترل افزایش یافته بود و اختلاف معنی‌داری را نیز با گروه‌های مداخله (مصاحبه انگیزشی) نشان داد که مشابه مطالعه حاضر است، زیرا در مطالعه آنها نیز گروه کنترل آموزش‌های استاندارد تعزیزی‌ای را دریافت کرده بودند. همچنین در مطالعه‌ای، نمره تمام سازه‌ها در گروه کنترل بعد از ۶ ماه تا حدودی کاهش یافت، در حالی که در گروه مصاحبه انگیزشی، نتایج از ثبات بیشتری برخوردار بودند که مشابه یافته‌های کنونی است^[۲۱]. در مطالعه‌ای با عنوان تاثیر مصاحبه انگیزشی بر کاهش وزن زنان با استفاده از تئوری انگیزش محافظت، نمره تمام سازه‌ها در گروه مصاحبه انگیزشی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی‌داری یافت. همچنین نمره سازه‌ها در گروه کنترل نیز بعد از مداخله افزایش یافته بود. دلیل آن همانند

- protection motivation theory. *Iran Red Crescent Med J.* 2015;17(6):e23492.
- 4- Daniali SS, Azadbakht L, Mostafavi DF. The relationship between body image, self-efficacy and physical activity in female employees of Isfahan University of Medical Science and University of Isfahan, Iran. *Health Sys Res.* 2012;8(6):991-1001. [Persian]
- 5- Bastos JP, Araújo CLP, Hallal PC. Prevalence of insufficient physical activity and associated factors in Brazilian adolescents. *J Phys Act Health.* 2008;5(6):777-94.
- 6- Sheikhholeslam R, Mohamad A, Mohammad K, Vaseghi S. Non communicable disease risk factors in Iran. *Asia Pac J Clin Nutr.* 2004;13:S100. [Persian]
- 7- Momenan A, Delshad M, Mirmiran P, Ghanbarian A, Safarkhani M, Azizi F. Physical inactivity and related factors in an adult Iranian population (Tehran Lipid and Glucose Study). *Iran J Endocrinol Metabol.* 2012;13(5):493-503.
- 8- Tucker JM, Tucker LA, LeCheminant J, Bailey B. Obesity increases risk of declining physical activity over time in women: A prospective cohort study. *Obesity.* 2013;21(12):E715-20.
- 9- Berlin JA, Colditz GA. A meta-analysis of physical activity in the prevention of coronary heart disease. *Am J Epidemiol.* 1990;132(4):612-28.
- 10- Wadden TA, Foster GD. Behavioral treatment of obesity. *Med Clin North Am.* 2000;84(2):441-61.
- 11- Haas WC, Moore JB, Kaplan M, Lazorick S. Outcomes from a medical weight loss program: primary care clinics versus weight loss clinics. *Am J Med.* 2012;125(6):e7-11.
- 12- Martins RK, McNeil DW. Review of motivational interviewing in promoting health behaviors. *Clin Psychol Rev.* 2009;29(4):283-93.
- 13- Navidian A, Abedi M, Baghban I, Fatehizadeh M, Poursharifi H. Effect of motivational interviewing on blood pressure of referents suffering from hypertension. *Trauma Mon.* 2010;15(2):115-21. [Persian]
- 14- Rollnick S, Miller WR, Butler CC, Aloia MS. Motivational interviewing in health care: Helping patients change behavior. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis.* 2008;5(3):203.
- 15- Westen D, Morrison K. A multidimensional meta-analysis of treatments for depression, panic, and generalized anxiety disorder: An empirical examination of the status of empirically supported therapies. *J Consult Clin Psych.* 2001;69(6):875-99.
- 16- Dusek JA, Hibberd PL, Buczynski B, Chang B-H, Dusek KC, Johnston JM, et al. Stress management versus lifestyle modification on systolic hypertension and medication elimination: A randomized trial. *J Altern Complement Med.* 2008;14(2):129-38.
- 17- Yoon E. Food defense management plan implementation intention: An application of protection motivation theory [Dissertation]. Manhattan: Kansas State University; 2007. p. 161.
- 18- Redd BR. Using the protection motivation theory to examine the effects of obesity fear arousal on the physical activity of young adult female college students[Dissertation]. Detroit, Michigan: Wayne State University. 2012. p. 171.
- 19- Lee SA, Wen W, Xu WH, Zheng W, Li H, Yang G, et al. Prevalence of obesity and correlations with lifestyle and dietary factors in Chinese men. *Obesity.* 2008;16(6):1440-7.
- 20- Navidian A, Abedi M, Baghban I, Fatehizadeh M, Poursharifi H, Hashemi Dehkordi M. Effects of

توجه به اینکه تغییر در شاخص‌های آنتروپومتریک مانند وزن و بهخصوص شاخص توده بدنی نیازمند صرف زمان بیشتری است، لذا معنی‌دار نشدن تاثیر بر این دو شاخص تا حدودی قابل انتظار است و می‌توان انتظار داشت با گذشت زمان این شاخص‌ها نیز بهبود معنی‌داری پیدا کنند.

با توجه به اینکه فقط جامعه زنان مورد بررسی قرار گرفتند، لذا نتایج مطالعه کنونی چنان قابل تعمیم نیست و نقطه قوت این مطالعه، بررسی و استفاده از روش مصاحبه انگیزشی به عنوان تکنیک جدید بود که در مطالعات اخیر به طور قابل توجهی مورد استفاده قرار گرفته است. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آینده، گروه در معرض خطر بیشتر مانند نوجوانان و جوانان و همچنین مردان نیز مورد بررسی قرار گیرند. همچنین توصیه می‌شود مدت زمان پیگیری افزایش یابد تا تاثیر مصاحبه انگیزشی بر شاخص‌های آنتروپومتریک تایید شود.

نتیجه‌گیری

اجرای مصاحبه انگیزشی، نمره تمام سازه‌های تئوری انگیزش محافظت و متعاقباً قصد انجام فعالیت بدنی را در زنان چاق با دارای اضافه‌وزن افزایش می‌دهد.

تشکر و قدردانی: بدین وسیله از کلیه زنان شرکت‌کننده در مطالعه، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان بهدلیل حمایت مالی و تایید در کمیته اخلاق دانشگاه و مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی بهدلیل حمایت علمی از طرح قدردانی می‌شود.

تاییدیه اخلاقی: این پژوهش در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی گلستان (به شماره ۱۰۰۱۶۳۹۳۰۵۰۵۶۰) تایید شده و با کد ثبت IRCT2015061517736N5 در مرکز کارآزمایی بالینی ایران ثبت شده است.

تعارض منافع: هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسنده‌گان بیان نشده است.

منابع مالی: این پژوهش از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان مورد حمایت مالی قرار گرفته است.

منابع

- 1- Rerksuppaphol S, Rerksuppaphol L. Association of obesity with the prevalence of hypertension in school children from central thailand. *J Res Health Sci.* 2014;15(1):17-21.
- 2- Lippa NC, Sanderson SC. Impact of information about obesity genomics on the stigmatization of overweight individuals: an experimental study. *Obesity.* 2012;20(12):2367-76.
- 3- Mirkarimi K, Mostafavi F, Eshghinia S, Vakili MA, Ozouni-Davaji RB, Aryaei M. Effect of motivational interviewing on a weight loss program based on the

- 2011.
- 25- Foley L, Prapavessis H, Maddison R, Burke S, McGowan E, Gillanders L. Predicting physical activity intention and behavior in school-age children. *Pediatr Exerc Sci.* 2008;20(3):342-56.
- 26- Solimanina A, Niknami S, Hajizadeh I, Shojaeezadeh D, Tavousi M. Predictors of physical activity to prevent osteoporosis based on extended health belief model. *Payesh.* 2014;13(3):313-20. [Persian]
- 27- Amireault S, Godin G, Vézina-Im L-A. Determinants of physical activity maintenance: A systematic review and meta-analyses. *Health Psychol Rev.* 2013;7(1):55-91.
- 28- Webb TL, Sheeran P. Does changing behavioral intentions engender behavior change? a meta-analysis of the experimental evidence. *Psychol Bull.* 2006;132(2):249-68.
- 29- Milne S, Sheeran P, Orbell S. Prediction and intervention in health-related behavior: A meta-analytic review of protection motivation theory. *J Appl Soc Psychol.* 2000;30(1):106-43.
- motivational interviewing on weight loss of individuals suffering. *Iran J Nutr Sci Food Technol.* 2010;5(2):45-52. [Persian]
- 21- Mostafavi F, Mirkarimi SK, Berdi Ozouni-Davaji R, Vakili MA, Eshghinia S. Effect of motivational interviewing on weight loss. *J Gorgan Univ Med Sci.* 2014;17(3):11-7. [Persian]
- 22- Aratijo-Soares V, McIntyre T, Sniehotta FF. Predicting changes in physical activity among adolescents: the role of self-efficacy, intention, action planning and coping planning. *Health Educ Res.* 2009;24(1):128-39.
- 23- Zhang Y, Cooke R. Using a combined motivational and volitional intervention to promote exercise and healthy dietary behaviour among undergraduates. *Diabetes Res Clin Pract.* 2012;95(2):215-23.
- 24- Park OH, Hoover L, Dodd T, Huffman L, Feng D. The use of the modified protection motivation theory to explore adult consumers' functional foods consumption behavior. Graduate Student Research Conference in Hospitality and Tourism. Texas: Texas Tech University;