



High Resolution Melt Analysis (HRM) and its Strategic Applications Especially in Molecular Genetics

ARTICLE INFO

Article Type

Analytic Review

Authors

Noori-Daloii M.R.* PhD,
Faraji K.1 BSc

How to cite this article

Noori-Daloii M.R, Faraji K. High Resolution Melt Analysis (HRM) and its Strategic Applications Especially in Molecular Genetics. *Quarterly of the Horizon of Medical Sciences*. 2016;22(1):77-88.

ABSTRACT

Introduction In wide and developing worlds of cellular and particularly molecular sciences, the most important issue that leads to paying more attention to and use a technique, is its critical features; high sensitivity, specificity, velocity and also being available and cheap. High Resolution Melting (HRM), may be one of these techniques. Its usage is growing among others significantly in investigations, for its special advantages. HRM is based on the pattern and characteristic of DNA when melting. DNA melting temperature (T_m), is the temperature that 50% of DNA molecules have become single stranded and 50% are double stranded. The pattern of getting single stranded is specific and unique for every DNA strand; and differences are shown as a graph called "melting curve". These are effective on DNA T_m : the value of bases G and C in both DNA strands (CG%), the length of fragment, the static effects of bases on each strand and the heterozygosity. In fact, the differences among melting curves results in recognition the special fragment. The way of being single stranded can be followed by fluorescence colors which attached to double stranded DNAs.

Conclusion High-resolution melting is powerful, fast, comprehensive and useful technique for using in molecular laboratory that can be considered as simple and fast approach for genotyping, mutation detection, matching sequence and methylation study.

Keywords High Resolution Melting; Molecular Biology; Molecular Diagnostic Techniques

CITATION LINKS

- [1] High resolution melting analysis for ... [2] High resolution melting applications for clinical laboratory... [3] A guide to High Resolution Melting... [4] Sensitivity and specificity of high-resolution melting analysis in ... [5] High-resolution melting curve analysis of genomic ... [6] Medical molecular genetics in the third ... [7] PCR amplification and high-resolution ... [8] High-resolution DNA melting analysis for simple and efficient molecular ... [9] High resolution melt analysis: a novel method for ... [10] Applications of comparative genomic hybridization in cancer and ... [11] Principles of High Resolution Melting ... [12] Emery's elements of medical ... [13] Hereditary breast cancer: pathobiology, clinical translation, and potential for targeted cancer ... [14] Molecular genetics, diagnosis, prevention and gene therapy in prostate cancer: Review ... [15] Molecular genetics and gene therapy in esophageal cancer: A review ... [16] High-resolution melting facilitates mutation screening of ... [17] Expanded instrument comparison of amplicon DNA melting analysis for ... [18] Rapid detection of carriers with BRCA1 and BRCA2 mutations using high resolution melting ... [19] An Efficient Classification for ... [20] A thermodynamic approach to PCR primer ... [21] High-resolution melting analysis for accurate detection of BRAF mutations: a systematic review and ... [22] High resolution melting analysis of KRAS, BRAF and PIK3CA in KRAS exon 2 wild ... [23] Detection of somatic mutations by high-resolution DNA ... [24] Evaluation of high-resolution melting analysis as a diagnostic tool to detect the BRAF V600E mutation in ... [25] High resolution melting analysis for rapid and ... [26] High resolution melting analysis for the ... [27] Diagnostic accuracy of high resolution melting analysis for detection of ... [28] Evaluation of High-Resolution Melting for Gene Mapping in ... [29] High-Resolution Genotyping by Amplicon Melting Analysis ... [30] Sensitivity and specificity of single-nucleotide ... [31] Expanded Instrument Comparison of ... [32] Application of high-resolution melting to ... [33] High-resolution DNA melting analysis in ... [34] A rapid and sensitive enzymatic method for epidermal ... [35] Methylation-sensitive high-resolution melting in ... [36] Methylation-sensitive high ... [37] A refined, rapid and reproducible high ... [38] High-resolution DNA melting analysis for ... [39] Bioinformatics tools ... [40] Introduction to high resolution melt ...

*Medical Genetics Department, Medicine Faculty, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
1Medical Genetics Department, Medicine Faculty, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Correspondence

Address: Medical Genetics Department, Medicine Faculty, Tehran University of Medical Sciences, Poursian Street, Keshavarz Boulevard, Tehran, Iran
Phone: +98218853005
Fax: +98218853005
nooridaloii@sina.tums.ac.ir

Article History

Received: January 14, 2015
Accepted: July 7, 2015
ePublished: December 15, 2015

فن ذوب DNA با تفکیک بالا و کاربردهای راهبردی آن بهویژه در ژنتیک مولکولی

محمدرضا نوری دلوبی* PhD


گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

کریم فرجی BSc

گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

استفاده قرار گیرد، آن است که فن مورد نظر از دقت، سرعت و ویژگی کافی برخوردار بوده و بهویژه دردسترس و کم‌هزینه باشد. فن HRM (ذوب‌شدگی با تفکیک بالا) را می‌توان یکی از این روش‌ها در نظر گرفت که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۳ به صورت مشترک توسط دانشگاه یوتا و یک مرکز پژوهشی بهنام /یدا/هو در ایالات متحده معرفی شد و اساس آن، توجه به الگو و رفتار ذوب DNA دورشته‌ای است^[1,2].

میزان به کارگیری این فن در کارهای پژوهشی، در مقایسه با سایر فنون به نحو چشمگیری رشد کرده و دلایل این رشد انجام‌آمیز را می‌توان در شایستگی‌ها و مزیت‌هایی دانست که این روش به خود اختصاص داده است (شکل ۱).



شکل ۱) روند استفاده از فن HRM از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۰

شماری از مزیت‌های این فن به شرح زیر است: دقت و حساسیت بالا در ردیابی تغییرات و واریانت‌های ژنتیکی، سرعت بالا در آنالیز نمونه‌ها، دردسترس بودن نمونه‌ها به‌خاطر سالماندن پس از پایان آنالیز، امکان استفاده دوباره یا استفاده از سایر فنون روی نمونه‌ها، قابلیت به کارگیری متعدد (استفاده در مطالعات همراهی، بررسی بلاک‌های هاپلوتیبی، تعیین ژنوتیپ چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی (SNP)، نقشه‌کشی DNA، ردیابی جهش، HLA تایپینگ و بررسی الگوی متیله‌شدن) و آشکاربودن نتایج^[1-7]. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نه‌چندان دور، این فن به عنوان یک روش مرسوم و پرکاربرد در آزمایشگاه‌های علوم مولکولی و بهویژه ژنتیک مولکولی مورد استفاده قرار گیرد.

مواجهه با عفونت‌های میکروبی مقاوم به دارو، نمونه‌ای از اهمیت قابل توجه این فن است. در چنین شرایطی است که تشخیص سریع نوع واریانت مقاوم و تجویز داروی مناسب بسیار ضروری خواهد بود. همچنین در شرایط اورژانس که نیاز است بیمار برای تجویز دوز مناسب دارو، سریع تعیین ژنوتیپ شود، فن HRM به خوبی جوابگوی آنها است^[8,9].

ویژگی‌های اصلی فن HRM

فن HRM برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ به صورت مشترک توسط دانشگاه یوتا و یک مرکز پژوهشی بهنام /یدا/هو در ایالات متحده، معرفی شد و داری سه ویژگی اصلی به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه: در دنیای گستردگی و در حال رشد علوم سلولی و بهویژه مولکولی، مهم‌ترین مساله‌ای که موجب می‌شود یک فن بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گیرد، آن است که از دقت، سرعت و ویژگی کافی برخوردار بوده و بهویژه دردسترس و کم‌هزینه باشد. میزان به کارگیری "ذوب‌شدگی با تفکیک بالا" در کارهای پژوهشی، در مقایسه با سایر فنون به نحو چشمگیری رشد کرده و دلایل این رشد را می‌توان در شایستگی‌ها و مزیت‌های این روش دانست. اساس ذوب‌شدگی با تفکیک بالا، توجه به الگو و رفتار ذوب رشتله‌های DNA در دمای خاص است. منظور از دمای ذوب DNA، دمایی است که در آن ۵۰٪ رشتله‌های DNA به صورت تک‌رشنده و ۵۰٪ به صورت دورشته هستند. الگوی تک‌رشنده‌شدن رشتله‌های DNA با هم متفاوت بوده و برای قطعه‌های متفاوت DNA کاملاً اختصاصی است. تفاوت این رفتار به صورت یک منحنی با عنوان "منحنی ذوب" نشان داده می‌شود و عامل‌های مانند غلظت بازهای C و G در قطعه دورشته‌ای، طول قطعه، نحوه توزیع بازها، اثر استاتیکی بازها روی یکدیگر و وجود هتروزیگوستی بر آن اثر می‌گذاردند. در واقع تفاوت الگوی منحنی، موجب شناسایی قطعه مورد نظر می‌شود. نحوه دورشته‌ای‌شدن DNA را می‌توان با رنگ‌های فلورسانس که تنها به DNA می‌دورشته‌ای متصل می‌شوند، دنبال نمود.

نتیجه‌گیری: ذوب‌شدگی با تفکیک بالا روشی بسیار قدرتمند، سریع، جامع و مفید برای به کارگیری در آزمایشگاه‌های مولکولی به حساب می‌آید که می‌توان آن را راه حلی ساده و سریع برای تعیین ژنوتیپ، ردیابی جهش، تطابق توالی و بررسی الگوی متیلاسیون دانست.

کلیدوازه‌ها: ذوب‌شدگی با تفکیک بالا، زیست‌شناسی مولکولی، فنون تشخیصی مولکولی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

*نوسنده مسئول: nooridalooi@sina.tums.ac.ir

مقدمه

در دنیای گستردگی و در حال رشد علوم سلولی و بهویژه مولکولی، مهم‌ترین مساله‌ای که موجب می‌شود یک فن بیشتر مورد توجه و

چندشکلی‌ها به عنوان یک تغییر ژنتیکی طبیعی در نظر گرفته می‌شوند و در واقع واریانتهای ژنتیکی در جمعیت‌های مختلف هستند که موجب بروجودآمدن تفاوت‌های ژنتیکی می‌شوند. چندشکلی‌ها می‌توانند در نواحی گوناگون ژنوم از جمله ناحیه کدکننده، ناحیه غیرکدکننده و نیز نواحی بین‌ژنی قرار گیرند. بر حسب اینکه چندشکلی‌ها در چه ناحیه‌ای قرار گیرند، آثار متفاوتی را می‌توان انتظار داشت. برای نمونه، اگر یک چندشکلی در ناحیه پروموتور یک ژن قرار گیرد، می‌تواند میان‌کنش عامل‌های رونویسی با این ناحیه ژنی را تحت تاثیر قرار دهد که در نتیجه آن، بیان ژن نیز دست‌خوش تغییر قرار می‌گیرد.


تا به امروز مطالعات زیادی از جمله مطالعه "همراهی" و "پیوستگی" روی چندشکلی‌ها و ارتباط آنها با بیماری‌های متفاوت انجام گرفته است و نتایج معنی‌داری از نقش داشتن این چندشکلی‌ها در ابتلا و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های متفاوت حاصل شده است. پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه فارماکوژنتیک حاکی از نقش داشتن چندشکلی‌ها در ایجاد پاسخ دارویی گوناگون در افراد متفاوت است. شایان ذکر است که یکی از دلایل مطرح شدن موضوع "پرشکی افرادی" نیز حضور چندشکلی‌ها و اهمیت آنها در ایجاد پاسخ درمانی متفاوت در افراد است^[6, 12].

فارماکوژنتیک برای اولین بار توسط وکل در سال ۱۹۵۹، برای مطالعه گوناگونی تعیین شده توسط ژنتیک که منحصرًأ توسط اثرات داروها نشان داده می‌شد، به کار رفت. امروزه فارماکوژنتیک، برای تشریح تاثیر ژن‌ها روی اثربخشی آثار جانبی داروها به کار می‌رود. در کنار فارماکوژنتیک، واژه دیگری به نام فارماکوژنومیک وجود دارد که به بررسی میان‌کنش ژنوم (یعنی ژن‌های چندگانه) و داروها می‌پردازد. فارماکوژنتیک/فارماکوژنومیک، بهدلیل آنکه میان‌کنش‌های دارویی نامطلوب، یک مسبب عدمه بیماری و مرگ‌ومیر هستند، اهمیت دارند^[13]. وجود این چندشکلی‌ها در انسان می‌تواند بر نحوه پاسخ بدن به بیماری‌ها، مواد شیمیایی، داروها، واکسن‌ها و دیگر عوامل تاثیر گذارد. چنانچه نوع این چندشکلی‌ها در جمعیت‌ها یا در هر فرد شناسایی شود، می‌تواند در زمینه‌های متفاوت از جمله محاسبه میزان استعداد ابتلا به بیماری‌های پیچیده و انواع سرطان‌ها، تجویز نوع و دوز داروها سودمند واقع شود^[14-18]. چندشکلی‌های تکنوکلئوتیدی در چهار گروه رده‌بندی می‌شوند (جدول ۱).

جدول ۱) طبقه‌بندی انواع رده‌های SNP

SNP	رده	فراآنی در انسان	تغییر معمول	Tm	تغییر بازی
یک		G/A و C/T			%۶۴
دو		C/A و G/T	بیشتر از ۰/۵ درجه		%۲۰
سه		C/G			%۹
چهار		A/T	کمتر از ۰/۲ درجه		%۷

- ۱- استفاده از رنگ فلورسنس با غلط نسبتاً بالا.
 - ۲- استفاده از یک ابزار دقیق جمع‌آوری تغییرات شدت نور فلورسنس بر حسب تغییرات دما.
 - ۳- استفاده از نرم‌افزاری پیچیده که با استفاده از الگوریتم، داده‌های فلورسنس را به صورت پیوسته درآورده و آنالیز می‌نماید^[3].
- اساس فن HRM را می‌توان توجه به الگو و رفتار ذوب رشته‌های DNA در یک دمای خاص معرفی کرد. منظور از دمای ذوب DNA (Tm)، دمایی است که در آن ۵۰٪ رشته‌های DNA به صورت تکرشته و ۵۰٪ به صورت دورشته حضور دارند. الگوی تکرشته‌ای شدن رشته‌های DNA با هم متفاوت بوده و برای قطعه‌های متفاوت DNA کاملاً اختصاصی است. تفاوت این رفتار به صورت یک منحنی با عنوان "منحنی ذوب" نشان داده می‌شود و عامل‌هایی مانند غلظت بازهای C و G در قطعه دورشته‌ای مورد نظر، طول قطعه، نحوه توزیع بازه‌ها، اثر استاتیک بازها بر یکدیگر و وجود هتروزیگوستی بر آن اثر می‌گذارند. در واقع تفاوت الگوی منحنی، موجب شناسایی قطعه مورد نظر می‌شود^[10]. نحوه دورشته‌ای شدن DNA را می‌توان با کمک رنگ‌های فلورسنس که تنها به DNAی دورشته‌ای متصل می‌شوند، دنبال نمود که شکل ۲ نشان‌دهنده این روند است.




شکل ۲) روند تکرشته‌ای شدن DNA دورشته‌ای حین افزایش دما. هم‌زمان با تکرشته‌ای شدن، رنگ فلورسنس شروع به جداشدن از قطعه‌های دورشته‌ای نموده و شدت آن کم می‌شود.

هنگامی که DNA شروع به تکرشته‌ای شدن می‌نماید، این رنگ‌ها نیز از DNA جدا می‌شود و شدت نور آن نیز همزمان با روند تکرشته‌ای شدن تقریباً ۱۰۰۰ برابر کاهش می‌یابد. کاهش شدت نور، اندازه‌گیری شده و یک نمودار براساس شدت نور - تغییرات دما ترسیم می‌شود. در مرحله بعد، این نمودارها نرمالیزه شده و الگوی آنها با الگوی منحنی‌های مربوط به نمونه استاندارد مقایسه شده و نتیجه گزارش می‌شود^[11].

- ### کاربردهای اصلی و مهم HRM
- (۱) کاربرد HRM در تعیین ژنوتیپ چندشکلی‌های تکنوکلئوتیدی (SNP)

منحنی مرجع متفاوت خواهد بود (شکل ۴). اخیراً از روش HRM برای دیابی جهش‌های نقطه در زن‌های همچون BRAF، PIK3CA و KRAS استفاده شده است که از حساسیت و دقت قابل قبولی برخوردار بوده است [23-27].



شکل ۴) تغییر الگوی ذوب رشته سالم و رشته دارنده جهش. موقع جهش در یک جایگاه بر روی DNA موجب تغییر الگو و رفتار ذوب DNA_i دورشتهای می‌شود.


در فن HRM به دلیل سالم‌ماندن نمونه‌ها پس از پایان آنالیز، امکان استفاده دیواره یا استفاده از سایر فنون دیگر روی آنها وجود دارد. برای نمونه، چنانچه نتایج بدست‌آمده در HRM مشکوک باشد می‌توان برای تایید، نمونه‌ها را برای توالی‌یابی ارسال نمود تا از درستی نتایج HRM مطمئن شد [1-3, 23].

استفاده از فن HRM برای دیابی جهش‌ها در مقایسه با دیگر روش‌های سریع و ارزانی (مانند SSCP، DGGE و DHPLC) وجود دارند که به صورت گسترده برای دیابی و غربالگری انواع جهش‌ها روی فرآوردهای PCR انجام می‌گیرند. در این روش‌ها از ماتریکس و یک ماده واسرشتکننده DNA استفاده می‌شود که در فن HRM نیازی به این مرحله نیست [6, 28, 29].

در روش SSCP (چندشکلی ساختاری تکرشته‌ای)، قطعه‌های DNA با کمک PCR تکثیر می‌یابند. سپس DNA_i دورشتهای روی ژل الکتروفورز حرکت داده می‌شود. حرکت DNA به اندازه قطعه بستگی دارد، بهنحوی که مولکول‌های کوچک از منافذ ژل به‌آسانی عبور می‌کنند. در الکتروفورز SSCP ابتدا از یک ماده واسرشتکننده مانند اوره برای تبدیل DNA_i دورشتهای به تکرشته‌ای استفاده می‌شود. حال اگر جهشی در قطعه مورد نظر وجود داشته باشد، الگوی حرکت آنها بر الکتروفورز متفاوت خواهد بود و به این ترتیب می‌توان قطعه‌های دارای جهش را از قطعه‌های طبیعی تمایز داد. این روش ساده بوده و در سطح گسترده‌ای به کار گرفته می‌شود. اگر چه مشکل عمده این روش آن است که بسیاری از جهش‌ها شناسایی نمی‌شوند، زیرا بسیاری از آنها تاثیری بر رشته دارای جهش ندارند، در نتیجه نقاوتی در الگوی مهاجرت قطعه‌ها روی ژل مشاهده نمی‌شود. بر همین اساس سطح دیابی و

لازم به ذکر است که توانایی HRM در تمایز این چندشکل‌ها از یکدیگر متفاوت است [11, 19]. تشخیص چندشکل‌های R�ه ۴ توسط HRM اندکی دشوار است. برای تشخیص این گروه، دستگاه باید این قابلیت را داشته باشد که افزایش دما را به صورت ۱/۱ درجه ۱/۱ درجه اعمال نماید تا بتوان نوکلوتیدهای A و T را تشخیص داد، علت این را می‌توان در تفاوت الکترواستاتیک بازها دانست [8, 20].

در روش HRM، برای تعیین ژنتیپ نمونه‌ها، مستقیماً از فرآوردهای PCR استفاده می‌شود و بنابراین نیازی به پروب نیست. برای نمونه، اگر تغییر A>C در یک توالی در نظر بگیریم، در حالت کلی ژنتیپ‌هایی که با آن موافق هستیم به صورت A/C و C/C خواهد بود. الگوی منحنی برای حالت‌های A/A و A/C یکسان خواهد بود و شکل C/C یک درجه بالاتر از شکل A/A قرار می‌گیرد. الگوی فرم‌های هتروزیگوت نیز با هم متفاوت خواهد بود (شکل ۳).



شکل ۳) تفاوت الگو و رفتار تکرشتهای شدن DNA_i دورشتهای که در یک جایگاه بازی از هم تمایز هستند؛ این تمایز موجب تغییر الگوی منحنی های ذوب می‌شود.

حال اگر بازه تغییرات دمایی را وسیع‌تر انتخاب نماییم (برای نمونه اگر افزایش دما به صورت ۱/۱ درجه باشد این بار ۱/۰ تنظیم شود)، می‌توان حالت‌های هترودوبلکس (C/A و A/C) و همودوبلکس (C/C و A/A) را نیز شناسایی کرد. لازم به ذکر است که الگوی منحنی‌های مربوط به یک ژنتیپ مجھول با الگوی منحنی مربوط به یک ژنتیپ استاندارد و مشخص (برای نمونه A/A) سنجیده شده و ژنتیپ مجھول تشخیص داده می‌شود. نحوه آنالیز داده‌های حاصل از HRM در ادامه مورد بحث قرار گرفته است [21, 22].

۲) کاربرد HRM در دیابی جهش‌های تک‌نوکلئوتیدی

در روش HRM، برای تعیین و شناسایی جهش، همانند تعیین ژنتیپ، مستقیماً از محصولات PCR استفاده می‌شود. در این روش نیز به یک منحنی مرجع و استاندارد نیاز است تا منحنی حاصل از نمونه‌های بیمار یا مجھول با آن سنجیده شود. در صورت وجود هر نوع تغییر در رشته مورد نظر، منحنی حاصل از آن با دوره ۲۲، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۴، فصل نامه افق دانش

پرداز[21]. در این روش ابتدا DNAی ژنومی بی سولفیتیه می شود تا سیتوزین های غیرمتیله به یوراسیل تبدیل شوند. سپس از DNA استفاده می شود. شایان تأکید است که طراحی پرایمر در فن MS-HRM حساس ترین و مهم ترین مرحله به شمار می آید. بر همین اساس پیشنهاد شده است که برای طراحی پرایمر از نرم افزار Methyl Primer Express® v1.0 طراحی پرایمر پرایم میگیری برای برنامه ریزی شده است، استفاده شود [11].

طول آمپلیکون، تعداد سایت هایی که قابلیت متیله شدن را دارند و قرار گیری CpG ها در درون توالی پرایمر، از جمله نکاتی هستند که در طراحی پرایمر باید مورد توجه قرار گیرند. طبیعتاً، هر چه تعداد سایت هایی که قابلیت متیله شدن را دارند در قطعه مورد نظر بیشتر باشد، میزان اختلاف T_m آن با نمونه های مرجع غیرمتیله و کاملاً متیله بیشتر می شود. این امر موجب تمایز بهتر منحنی های ذوب نمونه های مجھول می شود. در معتبرترین مقالات چاپ شده که از فن MS-HRM استفاده شده است، طول آمپلیکون ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ چفت باز و تعداد سایت های متیله شونده بالای ۱۶ سایت بوده است [21, 35, 36].

هنگامی که حداقل حساسیت تشخیص متیله شدن مورد نیاز است می توان پرایم را طوری طراحی کرد که در بردارنده گروه های CpG باشند. به عبارتی، پس از بی سولفیتیه نمودن نمونه ها، بازه های سیتوزین غیرمتیله به یوراسیل تبدیل می شوند و بدنبال آن هنگام اتصال پرایمر دارای گروه های CpG به DNAی غیرمتیله، "جفت شدن ناجور بازها" وجود خواهد داشت که همین امر میزان بازدهی پرایمر را کاهش می دهد. در نتیجه قطعه های متیله، به شکل کامل به پرایمر اتصال یافته و به سهولت تکثیر خواهد شد. همچنین چنانچه CpG در نزدیکی ناحیه ۳' پرایمر قرار داده شود، ویژگی آن برای اتصال به DNAی متیله افزایش خواهد یافت [21, 35-38].

سرانجام، منحنی های ذوب حاصل از نمونه های مجھول با منحنی های ذوب استاندارد (منحنی ذوب مربوط به نمونه های مرجع که دارای درصد متفاوت و مشخص متیله هستند) مقایسه شده و سپس نتیجه گزارش می شود.

نحوه انتخاب طول قطعه و اصول طراحی پرایمر در فن HRM

براساس منابع علمی معتبر و جدید در انتخاب طول قطعه مورد نظر برای تکثیر، موارد زیر باید رعایت شود [2-4, 20, 39]:

(الف) طول قطعه بین ۷۰ تا ۳۰۰ نوکلئوتید باشد:

اگر طول قطعه بیشتر از ۳۰۰ باز باشد، احتمال حضور SNP های ناخواسته در ناحیه مورد نظر افزایش یافته و در نتیجه منحنی های حاصل پیچیده می شود. همچنین، با افزایش طول قطعه احتمال تشکیل ساختارهای ثانویه برای DNAی دور شته ای افزایش می باید که بواسطه ساختار متفاوت، الگوی ذوب متفاوتی خواهد داشت.

تشخیص این فن برای جهش ها، در حدود ۷۰٪ گزارش شده است [4, 6, 22].

روش DGGE (الکتروفوروز روی ژل با شیب و اسرشت کننده) در مقایسه با فن SSCP با قدرت تشخیص بالای ۹۵٪، به مراتب موثرتر و کارآمدتر عمل می نماید، اما در مقابل، انجام آن پیچیده تر بوده و نیاز به تجهیزات نسبتاً پیچیده دارد. این روش روی فرآورده های PCR انجام می گیرد. در صورتی که قطعه های DNA در یک نوکلئوتید با هم متفاوت باشند، و اسرشت شدن آنها در سطح متفاوتی رخ می دهد. در این روش دو نمونه DNA در دو ستون جداگانه از یک ژل پلی آکریل آمید که دارای نسبتی از غلظت ماده و اسرشت کننده (ممولاً فرمامید) است قرار می گیرند، در ژل شروع به حرکت می کنند و زمانی که به نقطه مناسبی از غلظت ماده و اسرشت کننده می رسند شروع به جداسدن می نمایند. این نقطه به عنوان یک نقطه ذوب عمل کرده و در این حالت به صورت چشمگیری از سرعت حرکت قطعه ها کم می شود و برای قطعه های سالم و قطعه های دارای جهش متفاوت است. به این ترتیب قطعه دارای جهش رديابي می شود [12].

روش DHPLC (کروماتوگرافی مایع DNA با کارآیی بالا)، بیشتر برای شناسایی چندشکلی های تکنوکلئوتیدی استفاده شده و دارای قدرت تشخیص بالای ۹۶٪ است و روی فرآورده های PCR انجام می شود. اساس این روش تقریباً مشابه روش DGGE است که پژوهشگران را قادر به تشخیص مولکول های هترودوبلکس تولید شده در PCR می کند [12].

فن HRM در مقایسه با روش های مورد اشاره در بالا، مزایایی مشتمل بر موارد زیر دارد [1-3, 12]:

- (الف) عدم نیاز به ماتریکس.
- (ب) عدم نیاز به ماده و اسرشت کننده.
- (پ) انجام همه واکنش در HRM در درون لوله ها (روش لوله درسته) و عدم نیاز به خارج سازی فرآورده های PCR.
- (ت) به حداقل رسیدن احتمال ورود آلودگی به واکنش به دلیل عدم خروج فرآورده ها از لوله.

لازم به ذکر است که ویژگی و حساسیت فن HRM در رديابي تغیيرات تکنوکلئوتیدی در فرآورده های PCR با طول ۴۰۰ چفت باز برابر با ۱۰۰٪ در فرآورده های PCR با طول ۱۰۰۰-۴۰۰۰ چفت باز حساسیت آن برابر با ۹۶٪ و ویژگی آن برابر با ۹۹٪ است [1, 2, 26, 30-34].

۳) کاربرد HRM در بررسی تطابق توالی

تغیيرات الگوی متیله شدن در DNA، یکی از سازوکارهای اصلی اپی ژنتیکی برای کنترل بیان ژن است. فن MS-HRM (HRM) حساس به متیلاسیون (یک روش بسیار ساده است که می تواند با دقت و سرعت کافی به بررسی الگوی متیله شدن در ژنوم

در پی انجام این بخش مرحله چهارم با انتخاب گزینه Edit Profile، وارد قسمت مربوط به شرایط انجام PCR می‌شویم که در اینجا گزینه Hold نشانگر مدت زمان لازم برای فعال شدن آنژیم پلی‌مراز است که اکنون برای ۲ دقیقه و ۹۵°C تنظیم می‌شود. سپس در گزینه Cycling، دمای واسرشتن، تعداد چرخه‌ها و دمای اتصال پرایمر تنظیم می‌شود.

در پی آن با استفاده از گزینه Hi-Res Melt، بازه دمایی (برای نمونه ۷۰–۹۰°C) مورد نظر و میزان افزایش دما (۱۰ درجه) انتخاب می‌شود و در قسمت Gain Optimization عدد ۷۰ انتخاب می‌شود؛ به این معنی که شدت نور فلوئورنس از مقدار ۷۰، قابل شناسایی است.

مرحله پنجم: به نمایش دارمدن اطلاعات وارد شده برای کنترل دوباره. در نهایت با انتخاب گزینه Start Run، فرآیند PCR و (به می‌شود شروع می‌شود) [HRM](http://jcu.edu.au/cgc/HRMTA_design.pdf) مراجعه شود.

آنالیز HRM

برای آنالیز HRM در حالت کلی ۵ مرحله به شرح زیر باید طی شود:

- مرحله تکثیر (شکل ۵): به منظور تعیین صحت و مناسب بودن تکثیر، منحنی تکثیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. این منحنی به صورت صعودی است، به این صورت که در خلال روند تکثیر و ازدیاد فرآوردهای PCR، میزان اتصال رنگ فلوئورنس به فرآوردهای دورشتهای افزایش یافته و جذب فلوئورنس نیز افزایش می‌یابد. شایان ذکر است که برای آنالیز HRM نکات مهمی باید مورد توجه قرار گیرد؛ بهویژه آنکه "بازدھی" منحنی بالای ۱/۴ باشد، به "مرحله تراز" قابل قبولی رسیده باشد و فاصله نمونه‌ها بیشتر از ۳ چرخه نباشد.^[۱, ۲, ۱۱, ۴۰] اگر میزان C_T نمونه‌ها با هم متفاوت باشد بیانگر متفاوت بودن غلظت فرآوردهای PCR است که همین امر موجب پیچیده شدن تفسیر خواهد شد
- بررسی منحنی ذوب (شکل ۶): این بررسی روی منحنی مشتقی انجام می‌گیرد و هدف آن کسب اطمینان از اختصاصی بودن فرآوردهای مورد نظر است. چنانچه فرآوردهای غیراختصاصی وجود داشته باشند، حضور منحنی‌های درهم‌رفته و آشفته را شاهد هستیم.^[۱, ۲, ۱۱, ۴۰] منحنی مشتقی براساس منفی مشتق فلوئورنس تقسیم بر مشتق دما (محور Y) به دما (محور X) رسم می‌شود و اساس آن فرمول $-dT/dF$ است.

- مرحله نرمال کردن منحنی ذوب (شکل ۷): در این مرحله از منحنی استاندارد (نه مشتقی) استفاده می‌شود. پس از تعیین محدوده نواحی "پیش ذوب" و "پس ذوب"، نرم‌افزار ناحیه پیش ذوب را به مقدار ۱۰۰ به دست می‌آید. ناحیه پیش ذوب ناحیه‌ای است که همه فرآوردها حالت دورشتهای دارند و شدت فلوئورنس حداکثر است و ناحیه

توصیه می‌شود پس از انتخاب ناحیه مورد نظر، از لحظه تشکیل ساختارهای ثانویه نیز بررسی شود. برای این منظور باید از سایت DINAMELT استفاده شود، به این نحو که توالی مورد نظر را در ناحیه تعیین شده وارد نموده و گزینه Submit انتخاب شود. در نهایت شکل ساختارهای ثانویه به همراه میزان ΔG تشکیل هر کدام نمایش داده می‌شود.

لازم به ذکر است که میزان قابل قبول ΔG برای تشکیل ساختارهای ثانویه تا ۱ است.

چنانچه طول قطعه کمتر از ۷۰ نوكلئوتید باشد، میزان اتصال رنگ فلوئورنس کم بوده و در نهایت ردیابی و ثبت تعییرات رنگ فلوئورنس مشکل خواهد بود.

(ب) در طراحی پرایمر باید موارد زیر در نظر گرفته شود:^[۲-۴, ۲۰, ۳۹]

۱- ناجیهای که پرایمر برای آن طراحی می‌شود نباید داری SNP باشد، زیرا موجب ایجاد منحنی‌های پیچیده می‌شود.

۲- طول پرایمر بین ۲۲ تا ۲۵ نوكلئوتید باشد.

۳- از نرم‌افزارهایی مانند Primer Express® و ۳.۰ برای طراحی پرایمر استفاده شود.

۴- دمای اتصال پرایمرهای T_m بین ۵۸°C تا ۶۲°C باشد.

۵- اختلاف دمای T_m پرایمرهای معکوس و پیشرو بیشتر از ۲°C نباشد.

۶- میزان بازهای GC در پرایمرها بین ۳۰ تا ۸۰٪ باشد.

۷- ΔG انتهای ۳' پرایمرها بین -۵ تا -۹ باشد. مقادیر بیشتر از

۸- احتمال اتصال انتهای ۳' پرایمر را کاهش داده و در نهایت فرآوردهای تولید نخواهد شد. مقادیر کمتر از -۹ نیز احتمال تولید فرآوردهای غیراختصاصی را افزایش می‌دهد.

۹- ΔG تشکیل پرایمر دایم حداکثر تا -۴ باشد.

۱۰- تعداد بازهای CG در انتهای ۵' بیشتر از سه نباشد.

۱۱- همان انرژی آزاد گیپس است که به اندازهای که منفی تر باشد نشان‌دهنده خودبکار بودن انجام واکنش (اتصال پرایمر) است.

نحوه کار با نرم‌افزار HRM


مرحله اول: اجرای برنامه با انتخاب گزینه New Run و گزینه High Resolution Melting

مرحله دوم: انتخاب نوع پلیت با توجه به نوع دستگاه PCR.


مرحله سوم: بازشدن صفحه‌ای جدید پس از تایید مرحله دو، برای وارد کردن نام طرح، اطلاعات مربوط به طرح و حجم نهایی نمونه واکنش و کلیک کردن گزینه Next.

مرحله چهارم: انتخاب اطلاعات مربوط به شرایط انجام PCR و نوع رنگ فلوئورنس (رنگ مورد نظر Green و نوع فرآیند HRM انتخاب می‌شود).


فن ذوب DNA با تفکیک بالا و کاربردهای راهبردی آن بهویژه در ژنتیک مولکولی ۸۳
پس ذوب ناحیه‌ای است که همه فرآوردها به حالت تکرشته درآمده‌اند و دیگر جذب فلورسانس وجود ندارد [۱، ۲، ۱۱، ۴۰].



شکل ۵) پیچیدگی و نادرست شدن تفسیر با وجود تفاوت بیش از حد استاندارد C_T نمونه‌های مورد بررسی (اختلاف C_T در این نمونه‌ها بیشتر از حد مجاز بوده و بیانگر تفاوت غلط فرآورده‌ها در نمونه است)




شکل ۶) منحنی ذوب منحنی مشتقی بوده و به منظور بررسی اختصاصی بودن فرآورده‌های مورد نظر به کار می‌رود.



شکل ۷) تعیین محدوده نواحی "پیش ذوب" و "پس ذوب" توسط نرم‌افزار و ایجاد ناحیه منحنی نرمال شده. ناحیه پیش ذوب ناحیه‌ای است که همه فرآورده‌ها حالت دورشته‌ای دارند و شدت فلورسانس حداقل است و ناحیه پس ذوب ناحیه‌ای است که همه فرآورده‌ها به حالت تکرشته درآمده‌اند و دیگر جذب فلورسانس وجود ندارد.

فلوئورسنس به تغییرات دما را نشان می‌دهد^[1-3, 11, 40].
 ۵- خوانش اتوماتیک: در این مرحله دستگاه به صورت خودکار ژنتیپ نمونه‌های مجھول را تعیین می‌نماید و اطلاعات مربوط به ژنتیپ استاندارد را با ضریب تطابق ۹۰٪ با نمونه مجھول مرتبط می‌سازند. اگر میزان CI کمتر از ۹۰٪ باشد، آن نمونه را به عنوان واریانت معرفی می‌کند^[1-3, 11, 40].

۴- منحنی تمایز (شکل ۸): در این مرحله از یک منحنی استاندارد (برای نمونه، منحنی مربوط به A/A) استفاده می‌شود و سایر منحنی‌های به دست آمده با آن مقایسه می‌شود. به این صورت که نرم‌افزار، منحنی مربوط به نمونه استاندارد را صفر در نظر می‌گیرد و فاصله منحنی مربوط به نمونه‌های مجھول را نسبت به آن تعیین می‌کند. نمودار حاصله به شکل زنگولهای بوده و نسبت تغییرات



شکل ۸) مقایسه سایر منحنی‌های به دست آمده با یک منحنی استاندارد. منحنی مربوط به نمونه استاندارد صفر و فاصله منحنی مربوط به نمونه‌های مجھول نسبت به آن تعیین می‌شود. نمودار حاصله به شکل زنگولهای بوده و نسبت تغییرات فلوئورسنس به تغییرات دما را نشان می‌دهد.

و Light Cycler Roch Lightscanner 96/384 Rotor-Gene 6500 HRM اشاره کرد.

نکات قابل اهمیت و توجه خاص در استفاده از فن HRM

۱- طول قطعه‌ای که انتخاب می‌شود حداقل می‌بایست حاوی ۳۰۰ باز باشد، زیرا آنالیز قطعه‌های بزرگتر از دقت کافی برخوردار نیست. برای نمونه، شناسایی یک چندشکلی در یک رشته ۱۰۰ جفت باز به مراتب راحت‌تر از یک رشته ۵۰۰ جفت باز است^[1, 2, 11, 35].

۲- استفاده از فرآورده‌های خالص PCR. وجود هر گونه ناخالصی از جمله پرایمر دایمر یا فرآورده‌های غیراختصاصی موجب می‌شود که تفسیر نتایج حاصل شده با دشواری مواجه شود^[1, 2, 11, 35].

۳- استفاده از میزان قابل قبول از فرآورده PCR. داده‌های به دست آمده اصولاً زمانی قابل قبول است که میزان C_T (چرخه آستانه) رعایت شود. اصولاً نمونه‌هایی که حداقل تا چرخه ۳۰ ایجاد شده‌اند برای آنالیز مناسب هستند. فرآورده‌های "اثرات تخریب الگو" و "مقدار کم الگو" شروع اصولاً موجب تنوع در نتایج HRM می‌شوند.

۴- کنترل غلظت الگوی واردشونده به واکنش. مقدار الگوی اضافه شده به واکنش باید مناسب باشد. تنظیم محدوده C_T زیر ۳، تضمین کننده غلظت ورودی الگو در محدوده ۱۰ برابر است. به عبارتی، باید اختلاف C_T نمونه‌ها بیشتر از ۳ چرخه نباشد.

دستگاه‌های HRM

تا سال ۱۹۶۰ برای بررسی رفتار ذوب DNA از دورشته‌ای از پرتوی UV استفاده می‌شد. اساس این روش، اثر هایپرکرومیک است. به این نحو که با افزایش دما فرآورده‌های دورشته‌ای شروع به بازشدن از هم نموده و بازهای موجود در رشته‌ها بیشتر در دسترس قرار می‌گیرند. در نتیجه، میزان جذب UV نیز توسط این بازها بیشتر شده و این روند به صورت یک منحنی صعودی ثابت می‌شود. این روش دارای معایبی است. جدول ۲ مقایسه این دو روش را نشان می‌دهد.

جدول ۲) مقایسه فن HRM و روش مبتنی بر UV

UV	HRM	تفاوت‌ها
مقدار DNA مورد نیاز	نانوگرم/ng	زمان لازم برای ذوب
ساعت	دقیقه	سرعت
۰/۱-۱/۰°C در دقیقه	۰/۱-۱/۰°C	از ۱۹۹۷ برای بررسی الگوی ذوب DNA از دورشته‌ای، رنگ‌های فلوئورسنس جایگزین نور UV شدند و سرانجام در سال ۲۰۰۳ با توجه به این جایگزینی، اولين دستگاه High Resolution Melter-1 طراحی شد. به مرور زمان و افزایش میزان درخواست برای استفاده از این روش، دستگاه‌های آن از لحاظ دقت، سرعت و میزان گنجایش نمونه، بیشترفت کردند ^[1, 2] . از جمله اين دستگاه‌ها LightScanner 32 می‌توان به

از سال ۱۹۹۷ برای بررسی الگوی ذوب DNA از دورشته‌ای، رنگ‌های فلوئورسنس جایگزین نور UV شدند و سرانجام در سال ۲۰۰۳ با توجه به این جایگزینی، اولين دستگاه HRM با نام Resolution Melter-1 طراحی شد. به مرور زمان و افزایش میزان درخواست برای استفاده از این روش، دستگاه‌های آن از لحاظ دقت، سرعت و میزان گنجایش نمونه، بیشترفت کردند^[1, 2]. از جمله اين دستگاه‌ها LightScanner 32 می‌توان به

ازش کافی برخوردار نباشد. خطاهای احتمالی که در HRM با آنها مواجه می‌شویم معمولاً به دلیل بالابودن میزان C_{T} ، بیش از اندازبودن فرآورده PCR یا مربوط به اطلاعات منحنی‌های مذاب مانند عدم انتخاب دقیق دامنه منحنی‌ها و وجود منحنی‌هایی با دامنه ذوب متعدد است.

شایان تأکید است که برای رفع شماری از این مشکلات راه کارهایی مطرح شده‌اند که مهم‌ترین آنها در زیر معرفی می‌شود [1, 2, 11, 35, 40]:

۱- تکثیر با تاخیر: برای اکثر نمونه‌ها مقدار C_{T} بیشتر از ۳۰ هماند تکثیر احتمالاً به مرحله ثابت نرسیده است و دقت HRM ممکن است با افزایش کم در شدت فلوئورسنس تحت تاثیر قرار گیرد. این مشکل می‌تواند دلایل متعددی مشتمل بر موارد زیر داشته باشد:

(الف) پایین‌بودن کیفیت DNA که راه حل آن تکرار استخراج DNA است.

(ب) پایین‌بودن میزان DNA واردشده به واکنش HRM که راه حل آن بهینه‌سازی PCR، افزایش ورودی نمونه به واکنش یا افزایش تعداد چرخه است.

۲- تکثیر با تاخیر برخی از نمونه‌ها: برای برخی از نمونه‌ها مقدار C_{T} بیشتر از ۳۰ در این حالت مواردی مانند نمونه "خارج از رده" (نمونه‌ای که میزان C_{T} آن از نمونه‌های دیگر بسیار متفاوت است) و نیز تغییر T_m در منحنی HRM مشاهده می‌شود. تغییر T_m نیز موجب "خوانش متعدد" می‌شود. دلیل این مشکل را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد:

(الف) حجم واکنش در مورد نمونه "خارج از رده" به طور کاملاً واضحی کمتر یا بیشتر از مقدار لازم برای تکثیر باشد که راه حل آن تکرار واکنش HRM، کنترل صحت (یکسان‌بودن) حجم نمونه‌ها در چاهک‌ها، انجام اسپین مختصر پیش از بستن پلیت است.

(ب) ناکافی بودن میزان DNA اضافه شده به واکنش HRM که راه حل آن تکرار HRM و البته با میزان بیشتر DNA در هر واکنش است.

۳- بازدارندگی PCR: کم‌بودن شبیب منحنی تکثیر و بیشتر بودن میزان C_{T} از حد مورد انتظار در این حالت منحنی تکثیر دارای شبیب کم بوده و واکنش تکثیر احتمالاً به مرحله ثابت یا تراز نرسیده است. دقت HRM ممکن است با افزایش کم در فلوئورسنس تحت تاثیر قرار گیرد. بالابودن میزان C_{T} از میزان قابل انتظار بدین معنی است که میزان تکثیر، کم بوده و در نتیجه میزان C_{T} بالاتر باشد. منظور از بالابودن C_{T} آن است که غلطت آمپلیکون‌ها پایین است که علت این مشکل را می‌توان موارد زیر در نظر گرفت:

۵- کنترل فرآورده از بابت حضور ناجای قطعه‌های تکثیرشده غیرهدف. پیش از شروع HRM، بررسی دقیق منحنی‌های مربوط به قطعه‌های تکثیرشده در Real-Time ضروری است. عامل‌هایی مانند کم‌بودن میزان رنگ، حضور مهارکننده و تنظیم نادرست واکنش، بر انجام واکنش تاثیرگذار بوده و نتایج حاصل از HRM را بی‌ارزش یا کم‌دقیق می‌نماید [1, 2, 8, 11, 35].

۶- همه نمونه‌ها باید از نظر غلطت DNA و غلطت رنگ یکسان باشند. عامل‌هایی مانند غلطت نمکی محیط، غلطت بافر و غلطت Mg بر الگو و رفتار منحنی ذوب، تاثیر می‌گذارد. بسیار مهم است که برای استخراج DNA از یک روش یکسان و کیت مشخص استفاده شود تا شرایط انجام واکنش در همه نمونه‌ها یکسان باشد. حضور موادی مانند کلریدسدیم، ETOH، EDTA، ایزوپروپانول، سدیم‌سیترات و فنل موجب تغییر الگو و رفتار منحنی ذوب خواهد شد [1, 2, 11, 35].

۷- لوله‌هایی که واکنش در آنها انجام می‌باید یکسان باشد، زیرا جنس و ضخامت لوله‌ها در نتایج HRM، تاثیر می‌گذارد [1, 2, 11, 35].

۸- نوع آنزیمی که به کار می‌رود بهتر است از نوع "هاتاستارت" باشد که پس از ۱۰ دقیقه حرارت‌دیدن فعال شود تا از تشکیل پراپایر دایمیر جلوگیری شود. کاربرد این آنزیم‌ها موجب افزایش ویژگی و حساسیت واکنش نیز می‌شود [1, 2, 11, 35].

۹- از رنگ‌های فلوئورسنس نسل سوم که منحنی اختصاصی و دقیق ایجاد می‌نمایند استفاده شود. چنانچه پیش‌تر اشاره شد در فن HRM از رنگ‌های فلوئورسنس استفاده می‌شود. از رنگ‌های اولیه SYBR® Green I که در این تکنیک به کار می‌رود می‌توان رنگ I و نام برد. این رنگ تمایل به اتصال به نواحی غنی از بازهای C و G دارد. به همین خاطر نمی‌توان انتظار داشت که این رنگ به همه نواحی DNA به نحو یکسان متصل شود. در نتیجه هنگام جداسدن رنگ، الگوی مناسبی از محتوای بازی رشته هدف، در اختیار پژوهشگر قرار نمی‌گیرد. همچنین به کاربردن این رنگ در غلطت‌های بالا دارای اثر مهاری بر واکنش PCR است. ایراد دیگر این رنگ آن است که پس از جداسدن، احتمال دارد دوباره به قطعه دورشته‌ای DNA متصل شود [1, 2, 11, 28, 35, 40].

برای حل چالش‌های مورد اشاره در بالا، امروزه از نسل سوم رنگ‌های فلوئورسنس استفاده می‌شود که محدودیت‌های ذکرشده در بالا را ندارد. از جمله این رنگ‌ها می‌توان به ۹ SYTO® و Eva Green، GreenLC Green و غیره اشاره نمود [1, 2, 11, 35].

عیوب یابی واکنش HRM

رخداد خطای ایجاد مشکل در روند انجام آزمون‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است که موجب می‌شود نتایج بدست‌آمده از دقت و

طراحی شود که ناحیه‌ای که تکثیر می‌شود تنها دارای یک چندشکلی باشد.

(ب) طول آمپلیکون بیشتر از میزان استاندارد است که با طراحی دوباره پرایمربا هدف کاهش اندازه آمپلیکون می‌توان بر آن فایق آمد.

۶- حضور بیش از سه خوانش متنوع:

چنانچه ناحیه مورد بررسی دارای چندین چندشکلی تکنوکلئوتیدی ناشناخته باشد، چندین آمپلیکون هتروزیگوت و هموزیگوت تولید خواهد شد. همچنین اگر طوله قطعه (آمپلیکون) بیشتر از حالت استاندارد باشد، احتمال برخورد با این حالت نیز وجود دارد. خواستگاه این دشواری را می‌توان به موارد زیر نسبت داد:

(الف) حضور چندین چندشکلی تکنوکلئوتیدی در قطعه (در تعیین ژنتیپ)، که برای رفع آن توالی یابی فرآیند PCR برای بررسی تعداد چندشکلی‌ها توصیه می‌شود. چنانچه حضور چندین چندشکلی ثابت شود می‌بایست پرایمربا به نحوی طراحی شود که ناحیه‌ای که تکثیر می‌شود تنها دارای یک چندشکلی باشد.

(ب) طول آمپلیکون بیشتر از میزان استاندارد است که می‌توان با طراحی دوباره پرایمربا هدف کاهش اندازه آمپلیکون، به رفع آن اقدام نمود.

نتیجه‌گیری

روشی بسیار قدرتمند، سریع، جامع و مفید برای به کارگیری HRM در آزمایشگاه‌های مولکولی به حساب می‌آید که می‌توان آن را راه حلی ساده و سریع برای تعیین ژنتیپ، دیابی‌جهش، تطابق توالی و بررسی الگوی متیلاسیون دانست. تنوع در به کارگیری HRM در رویکردهای مطالعاتی متفاوت، سرعت بالا در جوابدهی، ارزان‌بودن، برخوردار بودن از دقت و اختصاصیت (۱۰۰٪) کافی در مقایسه با دیگر روش‌های مرسوم (مانند SSCP، DGGE و DHPLC) و به حداقل رسیدن احتمال آلوگی، این فن را در آینده‌ای نه‌چندان دور جایگزین سایر فنون مشابه می‌کند.

تشکر و قدردانی: موردی توسط نویسندها گزارش نشده است.

تاییدیه اخلاقی: موردی توسط نویسندها گزارش نشده است.

تعارض منافع: موردی توسط نویسندها گزارش نشده است.

منابع مالی: موردی توسط نویسندها گزارش نشده است.

منابع

- 1- Erali M, Wittwer CT. High resolution melting analysis for gene scanning. Methods. 2010;50(4):250-61.
- 2- Erali M, Voelkerding KV, Wittwer CT. High resolution melting applications for clinical laboratory medicine. Exp Mol Pathol. 2008;85(1):50-8.

(الف) حضور مواد مهارکننده PCR در نمونه‌های DNA، که راه حل آن (دقیق کردن نمونه‌ها با نسبت ۱:۱۰ یا ۱:۱۰۰، سپس تکرار HRM) است.

(ب) غلطت نمکی نادرست که برای رفع آن انجام تیتراسیون MgCl₂ برای پیداکردن غلطت نمکی مطلوب برای هر واکنش توصیه می‌شود.

(پ) کافی‌بودن میزان آنزیم در واکنش که می‌توان با اضافه کردن آنزیم به میزان ۱/۱۵٪ واحد در ماکولیتر برای هر واکنش آن را مرتفع کرد.

(ت) کافی‌بودن میزان پرایمربا در واکنش که راه حل آن اضافه کردن مقادیر تا ۵/۰ میکرومول از هر پرایمربا برای هر واکنش است.

(ث) بیشتر بودن اندازه قطعه‌ها از ۲۰۰ جفت باز که با افزایش زمان کشیدگی (اکستشن) در طول مرحله تکثیر می‌توان با آن مقابله کرد.

(ج) اتصال پرایمربا به چندین توالی هدف و تکثیر آنها که با انجام بلاست (BLAST) برای پرایمربا و تعیین ویژگی آنها در صورت نیاز طراحی دوباره پرایمربا، قابل رفع است.

۴- تکثیر غیراختصاصی: کاهش بازدهی و آمپلیکون‌های چندگانه PCR

در این حالت بازدهی PCR کاهش می‌یابد. افزون بر این، حضور همزمان چندین آمپلیکون موجب تغییر رفتار و الگوی منحنی ذوب می‌شود که علت این مشکل را می‌توان موارد زیر در نظر گرفت:

(الف) غلطت نمکی نادرست که راه حل آن انجام تیتراسیون MgCl₂ برای پیداکردن غلطت مطلوب نمکی برای هر واکنش است.

(ب) اتصال پرایمربا به چندین توالی هدف و تکثیر آنها برای رفع این مشکل، انجام بلاست برای پرایمربا و تعیین ویژگی‌های آنها توصیه می‌شود. افزون بر این در صورت نیاز، پرایمربا باید دوباره طراحی شوند. همچنین می‌توان تعداد چرخه‌های تکثیر را کاهش داد.

۵- نواحی ذوب چندگانه: منحنی‌های ذوب پیچیده با نواحی ذوب چندگانه

شایان تاکید است که تفسیر منحنی‌های ذوب پیچیده با مناطق ذوب چندگانه بسیار دشوار است. این حالت زمانی رخ می‌دهد که طوله قطعه (آمپلیکون) بیشتر از حالت استاندارد باشد که علت این مشکل را می‌توان موارد زیر در نظر گرفت:

(الف) حضور چندین چندشکلی تکنوکلئوتیدی در قطعه (در فرآیند ژنتیپ کردن) که راه حل آن مشکل، توالی یابی فرآورده PCR برای بررسی تعداد چندشکلی است. چنانچه حضور چندین چندشکلی ثابت شود می‌بایست پرایمربا به نحوی

- Science. Switzerland: Springer International Publishing; 2013. pp. 171-85.
- 20- Mann T, Humbert R, Dorschner M, Stamatoyannopoulos J, Noble WS. A thermodynamic approach to PCR primer design. *Nucleic Acids Res.* 2009;37(13):e95.
 - 21- Chen D, Wang YY, Chuai ZR, Huang JF, Wang YX, Liu K, et al. High-resolution melting analysis for accurate detection of BRAF mutations: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep.* 2014;4:4168.
 - 22- Guedes JG, Veiga I, Rocha P, Pinto P, Pinto C, Pinheiro M, et al. High resolution melting analysis of KRAS, BRAF and PIK3CA in KRAS exon 2 wild-type metastatic colorectal cancer. *BMC Cancer.* 2013;13:169.
 - 23- Gonzalez-Bosquet J, Calcei J, Wei JS, Garcia-Closas M, Sherman ME, Hewitt S, et al. Detection of somatic mutations by high-resolution DNA melting (HRM) analysis in multiple cancers. *PLoS One.* 2011;6(1):e14522.
 - 24- Pichler M, Balic M, Stadelmeyer E, Ausch C, Wild M, Guell C, et al. Evaluation of high-resolution melting analysis as a diagnostic tool to detect the BRAF V600E mutation in colorectal tumors. *J Mol Diagn.* 2009;11(2):140-7.
 - 25- Do H, Krypuy M, Mitchell PL, Fox SB, Dobrovic A. High resolution melting analysis for rapid and sensitive EGFR and KRAS mutation detection in formalin fixed paraffin embedded biopsies. *Bio Med Cancer.* 2008;8:142.
 - 26- Krypuy M, Newnham GM, Thomas DM, Conron M, Dobrovic A. High resolution melting analysis for the rapid and sensitive detection of mutations in clinical samples: KRAS codon 12 and 13 mutations in non-small cell lung cancer. *Bio Med Cancer.* 2006;6:295.
 - 27- Liu Y-P, Wu H-Y, Yang X, Xu H-Q, Chen D, Huang Q, et al. Diagnostic accuracy of high resolution melting analysis for detection of KRAS mutations: a systematic review and meta-analysis. *Sci Rep.* 2014;4:7521.
 - 28- Li J, Wang X, Dong R, Yang Y, Zhou J, Yu C, et al. Evaluation of High-Resolution Melting for Gene Mapping in Rice. *Plant Mol Biol Rep.* 2011;29(4):979-85.
 - 29- Wittwer CT. High-Resolution Genotyping by Amplicon Melting Analysis Using LCGreen. *Clin Chem.* 2003;49(6 Pt 1):853-60.
 - 30- Reed GH, Wittwer CT. Sensitivity and specificity of single-nucleotide polymorphism scanning by high-resolution melting analysis. *Clin Chem.* 2004;50(10):1748-54.
 - 31- Herrmann MG, Durtschi JD, Wittwer CT, Voelkerding KV. Expanded Instrument Comparison of Amplicon DNA Melting Analysis for Mutation Scanning and Genotyping. *Clin Chem.* 2007;53(8):1544-8.
 - 32- Martino A, Mancuso T, Rossi AM. Application of high-resolution melting to large-scale, high-throughput SNP genotyping: a comparison with the TaqMan method. *J Biomol Screen.* 2010;15(6):623-9.
 - 33- Montgomery JL, Sanford LN, Wittwer CT. High-resolution DNA melting analysis in clinical research and diagnostics. *Expert Rev Mol Diagn.* 2010;10(2):219-40.
 - 34- Janne PA, Borras AM, Kuang Y, Rogers AM, Joshi VA, Liyanage H, et al. A rapid and sensitive enzymatic method for epidermal growth factor receptor mutation screening. *Clin Cancer Res.* 2006;12(3 Pt 1):751-8.
 - 35- Wojdacz TK. Methylation-sensitive high-resolution melting in the context of legislative requirements for validation of analytical procedures for diagnostic applications. *Expert Rev Mol Diagn.* 2012;12(1):39-47.
 - 3- Applied Biosystems. A guide to High Resolution Melting (HRM) analysis. 2012. Available from: <http://www.gene-quantification.com/ab-hrm-guide.pdf>.
 - 4- Ye MH, Chen JL, Zhao GP, ZHeng MQ, Wen J. Sensitivity and specificity of high-resolution melting analysis in screening unknown SNPs and genotyping a known mutation. *Animal Sci Papers Reports.* 2010;28(2):161-70.
 - 5- Cho MH, Ciulla D, Klanderman BJ, Raby BA, Silverman EK. High-resolution melting curve analysis of genomic and whole-genome amplified DNA. *Clin Chem.* 2008;54(12):2055-8.
 - 6- Noori-Daloii MR. Medical molecular genetics in the third millennium. Tehran: Samber Publishing; 2009.
 - 7- Castellanos E, Aranaz A, De Buck J. PCR amplification and high-resolution melting curve analysis as a rapid diagnostic method for genotyping members of the Mycobacterium avium-intracellulare complex. *Clin Microbiol Infect.* 2010;16(11):1658-62.
 - 8- Reed GH, Kent JO, Wittwer CT. High-resolution DNA melting analysis for simple and efficient molecular diagnostics. *Pharmacogenomics.* 2007;8(6):597-608.
 - 9- Watts AM. High resolution melt analysis: a novel method for studying the genetic relatedness of *Pseudomonas aeruginosa* isolates from clinical and environmental sources [Dissertation]. Brisbane, Australia: Queensland University of Technology; October 2013.
 - 10- Noori-Daloii MR, Jalilian N. Applications of comparative genomic hybridization in cancer and genetic disorders: A review article. *Tehran Uni Med J.* 2011;68(1):1-11. [Persian]
 - 11- QIAGEN. Principles of High Resolution Melting (HRM) technology [Cited 2015, 4 July]. Available from: <https://www.qiagen.com/ir/resources/technologies/hrm/principle%20of%20hrm%20technology/>.
 - 12- Noori-Daloii MR. Emery's elements of medical genetics. 6th edition. Tehran: Jame'e Negar and Salami publishing; 2012.
 - 13- Rubinstein WS. Hereditary breast cancer: pathobiology, clinical translation, and potential for targeted cancer therapeutics. *Fam Cancer.* 2008;7(1):83-9.
 - 14- Noori-Daloii MR, Ebrahimzade Vesal E. Molecular genetics, diagnosis, prevention and gene therapy in prostate cancer: Review article. *Tehran Uni Med J.* 2009;67(1):1-14. [Persian]
 - 15- Noori-Daloii MR, Maheronnaghsh R, Sayyah MK. Molecular genetics and gene therapy in esophageal cancer: A review article. *Tehran Univ Med J.* 2011;69(6):331-43. [Persian]
 - 16- Wang F, Shen H, Guan M, Wang Y, Feng Y, Weng X, et al. High-resolution melting facilitates mutation screening of rpsL gene associated with streptomycin resistance in *Mycobacterium tuberculosis*. *Microbiol Res.* 2011;166(2):121-8.
 - 17- Herrmann MG, Durtschi JD, Wittwer CT, Voelkerding KV. Expanded instrument comparison of amplicon DNA melting analysis for mutation scanning and genotyping. *Clin Chem.* 2007;53(8):1544-8.
 - 18- Takano EA, Mitchell G, Fox SB, Dobrovic A. Rapid detection of carriers with BRCA1 and BRCA2 mutations using high resolution melting analysis. *Bio Med cancer.* 2008;8:59.
 - 19- Batnyam N, Gantulga A, Oh S. An Efficient Classification for Single Nucleotide Polymorphism (SNP) Dataset. In: Lee R, editor. Computer and Information

- resolution DNA melting analysis for simultaneous mutation scanning and genotyping in solution. *Clin Chem.* 2005;51(10):1770-7.
- 39- Abd-Elsalam KA. Bioinformatics tools and guideline for PCR primer design. *Afr J Biotechnol.* 2003;2(5):91-95.
- 40- Kapa Biosystems. Introduction to high resolution melt analysis. Cape Town, South Africa: Kapa Biosystems Company; 2015. Available from: https://www.kapabiosystems.com/assets/Introduction_to_High_Resolution_Melt_Analysis_Guide.pdf
- 36- Wojdacz TK, Dobrovic A. Methylation-sensitive high resolution melting (MS-HRM): A new approach for sensitive and high-throughput assessment of methylation. *Nucleic Acids Res.* 2007;35(6):e41.
- 37- Tse MY, Ashbury JE, Zwingerman N, King WD, Taylor SAM, Pang SC. A refined, rapid and reproducible high resolution melt (HRM)-based method suitable for quantification of global LINE-1 repetitive element methylation. *BMC Res Notes.* 2011;4:565.
- 38- Zhou L, Wang L, Palais R, Pryor R, Wittwer CT. High-