



# Effect of Hydroalcholic Extract of *Nigella sativa* on Doxorubicin-Induced Functional Damage of Kidney in Rats

## ARTICLE INFO

### Article Type

Original Research

### Authors

Mohebbati R.<sup>1</sup> MSc,  
Abbsnezhad A.<sup>2</sup> PhD,  
Khajavi Rad A.\* MD, PhD,  
Mousavi S.M.<sup>1</sup> MSc,  
Haghshenas M.<sup>1</sup> MSc

### How to cite this article

Mohebbati R, Abbsnezhad A, Khajavi Rad A, Mousavi S.M, Haghshenas M. Effect of Hydroalcholic Extract of *Nigella sativa* on Doxorubicin-Induced Functional Damage of Kidney in Rats. Quarterly of the Horizon of Medical Sciences. 2016;22(1):13-20.

## ABSTRACT

**Aims** Doxorubicin is an important anti-cancer drug which can cause renal toxicity. *Nigella sativa* has anti-inflammatory and antioxidant effects. The aim of this study was to determine the effects of hydroalcoholic extract of *Nigella sativa* on doxorubicin-induced functional damage of kidney in rats.

**Materials & Methods** This experimental study was implemented, using 32 male Wistar rats which were divided randomly into 4 groups; control, doxorubicin (5mg/kg), *Nigella sativa* extract (200mg/kg) and *Nigella sativa* plus doxorubicin. The groups were treated for 5 consecutive weeks and on days 0, 6, 10, 14, 21, 28, 35; the 24-hour urine samples and serum were collected to measure the levels of serum and urine glucose, serum urea, urea clearance and Glomerular Filtration Rate. Statistical analyses were made using one-way ANOVA followed by the Tukey's test and paired T test.

**Findings** The mean of serum urea on day 10 in doxorubicin group was significantly increased compared to the pre-injection state. The mean of urine glucose on day 28 in *Nigella sativa* plus doxorubicin group was significantly decreased compared to doxorubicin group. The means of GFR on days 21 and 35 in doxorubicin group were significantly decreased compared to control day. The means of GFR on days 21, 28, 35 in *Nigella sativa* plus doxorubicin group were significantly increased compared to doxorubicin group. The means of glucose on days 21 and 28 in doxorubicin group were significantly decreased compared to control day.

**Conclusion** The hydroalcoholic extract of *Nigella sativa* reduces the doxorubicin-induced functional damage of kidney in rats and helps improve the Glomerular Filtration Rate rate and decreases the glucosuria.

**Keywords** *Nigella sativa*; Renal Insufficiency; Doxorubicin; Glomerular Filtration Rate; Glucosuria

## CITATION LINKS

- [1] Adriamycin nephropathy: A model of focal segmental ... [2] Experimental models for ... [3] Adriamycin alters glomerular endothelium to ... [4] Curcumin prevents adriamycin nephrotoxicity in ... [5] Pharmacological and toxicological properties of *Nigella sativa* ... [6] Immunomodulatory and therapeutic properties of ... [7] Possible mechanism(s) for relaxant effect of aqueous and macerated extracts from *Nigella sativa* on tracheal chains of... [8] Blackseed, *Nigella sativa*, deserves more ... [9] A review of medicinal uses and pharmacological activities of ... [10] *Nigella sativa* oil for prevention of chronic cyclosporine nephrotoxicity: An experimental ... [11] Protective effects of *Nigella sativa* against gentamicin-induced nephrotoxicity in ... [12] Tietz textbook of clinical chemistry and molecular ... [13] ICRF-187 (dexrazoxane) protects from adriamycin-induced nephrotic syndrome in ... [14] Determination of serum creatinine by Jaffe method and how to calibrate to eliminate matrix interference ... [15] Hyperlipidemic nephropathy induced by adriamycin: effect of melatonin ... [16] Daunomycin (daunorubicin) and adriamycin and structural analogues: biological activity and mechanism of action ... [17] Impact of bone-marrow-derived mesenchymal stem cells on adriamycin-induced chronic ... [18] Protection effect of Zhen-Wu-Tang on Adriamycin-Induced Nephrotic syndrome via inhibiting oxidative lesions and inflammation ... [19] Dysfunction of the PGC-1alpha-mitochondria axis confers adriamycin-induced podocyte ... [20] Effect of Qufeng Tongluo Recipe on expression of desmin and CD2AP proteins in adriamycin-induced nephropathy rats: An experimental ... [21] Qiguiyishen decoction reduced the accumulation of extracellular matrix in the kidneys of rats with adriamycin-induced ... [22] Thymoquinone attenuates Doxorubicin-induced nephrotoxicity in rats: Role of Nrf2 and ... [23] Pathophysiological aspects of edema formation in diabetic ... [24] Aqueous extract of Astragalus Radix ... [25] Chemopreventive effect of curcumin, a ... [26] Pressor mechanisms in adriamycin-induced nephropathy with hypertension in ... [27] Phytonutritive potential of lycopene from ... [28] Ameliorative effect of Luffa acutangula ...

\*Physiology Department, Medicine Faculty, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

<sup>1</sup>Physiology Department, Medicine Faculty, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

<sup>2</sup>Basic Sciences Department, Medicine Faculty, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

### Correspondence

Address: Department of Physiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Azadi Square, Mashhad, Iran. Postal Code: 917794-8564

Phone: +985138828565

Fax: +985138828564

khajavirada@mums.ac.ir

### Article History

Received: May 30, 2015

Accepted: October 31, 2015

ePublished: December 15, 2015

## مقدمه

نفروپاتی یکی از علل مرگ‌ومیر بوده که شیوع آن در جهان در حال افزایش است. نفروپاتی عبارت است از کاهش نسبی عملکرد کلیه که با سندروم نفرتیک، نکروز گلومرولی، آبومینوری، گلوکوزوری، کاهش میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR)، افزایش فشار خون و اختیاب مایع همراه است<sup>[۱]</sup>. نفروپاتی با آسیب پودوستیت‌ها به دنبال نکروز گلومرولی، التهاب توپولی و فیبروز مشخص می‌شود<sup>[۲]</sup>.

یکی از مدل‌های ایجاد نفروپاتی در حیوانات استفاده از دوکسوروپیسین (Doxorubicin) یا آدریامایسین (Adriamycin) است. دوکسوروپیسین از آنتی‌بیوتیک‌های خدسرطان بوده و در بسیاری از سلطان‌ها مانند سلطان مثانه، پستان، معده و تیروئید کاربرد دارد و یکی از عوارض مهم آن ایجاد نفروپاتی است<sup>[۳]</sup>.

دوکسوروپیسین سبب افزایش دفع N-استیل گلوکزامین (NAG)، گلیکوز آمینو گلیکان (GAG) و فیبرونکتین از ادار، کاهش سرعت فیلتراسیون گلومرولی (GFR)، کاهش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان از قبیل گلوتاتیون و گلوتاتیون پراکسیداز، افزایش القای لیپیدپراکسیداسیون میکروزومی و میتوکندریائی و هیدروژن پراکسیداز می‌شود. افزایش میزان لیپیدپراکسیداسیون، هیدروژن پراکسیداز و کاهش میزان آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان از مهم‌ترین علل آسیب اکسیداتیو کلیوی هستند<sup>[۴]</sup>.

سیاهدانه (*Nigella sativa*) از خانواده آلاله (رانونکولاسه)، گیاهی دارویی است که به طور وسیع برای مقاصد درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواد موثره اصلی در عصاره آبی - کلی سیاهدانه، تیموکینون (بیشترین فعالیت فارماکولوژیک را دارد)، دی‌تیموکینون، تیموهیدروکینون و تیمول هستند. ۳۶ تا ۳۸٪ وزن سیاهدانه را چربی تشکیل می‌دهد و علاوه بر چربی، پروتئین، ویتامین‌ها، مواد معدنی و کربوهیدرات‌ها نیز در دانه سیاهدانه وجود دارد<sup>[۵]</sup>. سیاهدانه دارای اثرات فارماکولوژیک متعددی است که می‌توان به اثر آنتی‌اکسیدانی، خدالتهاپی، ضدآپوپتوزی، تنظیم‌کننده سیستم ایمنی و خدسرطان اشاره نمود<sup>[۶]</sup>. پیامبر (ص) در حدیشی فرموده‌اند: "بر شما باد مصرف سیاهدانه که همانا علاج تمام بیماری‌ها به جز مرگ در آن وجود دارد"<sup>[۷]</sup>.

سیاهدانه سمیت کلیوی ناشی از سیسی‌پلاتین را بهبود می‌بخشد و سطوح نیتروژن اوره و کراتینین خون را کاهش می‌دهد. تیموکینون که ماده موثره اصلی سیاهدانه است، خاصیت آنتی‌اکسیدانی قوی داشته و کلیه‌ها را در برابر نفروپاتی ناشی از دوکسوروپیسین و پروتئینوری، آبومینوری و هایپرلیپیدمی همراه با سندروم نفرتیک محافظت می‌کند<sup>[۹]</sup>. تجویز روغن سیاهدانه به موش‌های مصرف‌کننده سیکلوكسپورین، موجب بهبود عملکرد شاخص‌های بافت‌شناسی کلیه می‌شود<sup>[۱۰]</sup>. همچنین روغن سیاهدانه اثر نفوتوکسیک جنتامایسین در موش را مهار می‌کند<sup>[۱۱]</sup>.

## اثر عصاره آبی - کلی سیاهدانه بر آسیب عملکرد کلیوی ناشی از دوکسوروپیسین در موش‌های صحراوی

### رضا محبتی

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

### عباسعلی عباس‌نژاد PhD

گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

### ابوالفضل خواجه‌راد \* MD, PhD

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

### سیدمحمتبی موسوی MSc

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

### میلاد حق‌شناس MSc

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

### چکیده

**هدف:** دوکسوروپیسین از داروهای مهم خدسرطان است که باعث سمیت کلیوی می‌شود. سیاهدانه دارای اثرات خدالتهاپی و آنتی‌اکسیدانی است. هدف این مطالعه، تعیین اثرات عصاره آبی - کلی تخم سیاهدانه بر آسیب عملکرد کلیوی ناشی از دوکسوروپیسین در موش‌های صحراوی بود.

**مواد و روش‌ها:** در این مطالعه تجربی، ۳۲ سر موش صحراوی نزد نژاد ویستار به طور تصادفی ساده به ۴ گروه آلتایی تقسیم شدند؛ گروه شاهد، گروه دوکسوروپیسین (۵میلی‌گرم بر کیلوگرم)، گروه عصاره سیاهدانه ۲۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم) و گروه عصاره سیاهدانه به همراه دوکسوروپیسین. گروه‌ها به مدت ۵ هفته تیمار شدند و در روزهای صفر، ۶، ۱۰، ۱۴، ۲۱، ۲۸ و ۳۵ نمونه سرم و ادرار ۲۴ ساعته آنها جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه، تعقیبی توکی و T-زوچی تحلیل شدند.

**یافته‌ها:** میانگین اوره سرم در روز ۱۰ در گروه دوکسوروپیسین در مقایسه با قبل از تزریق، افزایش معنی‌داری داشت. میانگین غلظت گلوکز ادرار در روز ۲۸ در گروه سیاهدانه به همراه دوکسوروپیسین در مقایسه با گروه دوکسوروپیسین کاهش معنی‌داری یافت. میانگین GFR در روزهای ۲۱ و ۳۵ در گروه دوکسوروپیسین در مقایسه با روز کنترل کاهش معنی‌داری داشت. میانگین GFR در روزهای ۲۸ و ۳۵ در گروه سیاهدانه به همراه دوکسوروپیسین در مقایسه با گروه دوکسوروپیسین افزایش معنی‌داری داشت. میانگین گلوکز سرم در روزهای ۲۱ و ۲۸ در گروه دوکسوروپیسین در مقایسه با روز کنترل کاهش معنی‌داری داشت.

**نتیجه‌گیری:** عصاره آبی - کلی تخم سیاهدانه، آسیب عملکرد کلیوی ناشی از دوکسوروپیسین در موش‌های صحراوی را کاهش داده و سبب

بهبود میزان GFR و کاهش گلوکوزوری می‌شود.

**کلیدواژه‌ها:** سیاهدانه، سمیت کلیوی، دوکسوروپیسین، میزان فیلتراسیون گلومرولی، گلوکوزوری

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

\*نویسنده مسئول: khajavirada@mums.ac.ir

ورید دمی در روز هفتم مطالعه انجام شد.

۳- گروه سیاهدانه به همراه دوکسوروپیسین: درمان با عصاره هیدرولالکلی سیاهدانه به میزان ۲۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم به مدت ۶ روز و سپس تزریق دوکسوروپیسین در روز هفتم و به دنبال آن به مدت ۲۸ روز روزانه به صورت خوارکی انجام شد.

۴- گروه عصاره سیاهدانه: حیوانات مشابه گروه ۳، عصاره هیدرولالکلی سیاهدانه را به میزان ۲۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم بدون تزریق دوکسوروپیسین دریافت کردند.

حیوانات تمام گروهها دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند و تزریق دوکسوروپیسین دریافت نداشتند.

موش‌های صحرایی یک روز قبل از روز صفر و نیز در روزهای ۵، ۹، ۱۳، ۲۰، ۲۷ و ۳۴ مطالعه به مدت ۲۴ ساعت در داخل قفس متابولیک قرار گرفتند و ادرار ۲۴ ساعته و همچنین نمونه خون از سینوس غاری چشم در روزهای فوق جمع‌آوری شد. حجم نمونه‌های به دست‌آمده ادرار توسط مزور اندازه‌گیری شد و نمونه‌های خون نیز به مدت ۳۰ دقیقه در هوای آزمایشگاه قرار گرفت و سپس توسط سانتریفیوز با سرعت ۴۰۰۰ دور در دقیقه و به مدت ۱۰ دقیقه، سرم از لخته خون جدا شد. نهایتاً نمونه‌های ادرار و سرم برای انجام آزمایشات در داخل میکروتیوب و در دمای  $-20^{\circ}\text{C}$  نگهداری شدند.

پس از پایان دوره مطالعه و کشتن حیوانات به روش اخلاقی، بدن و کلیه راست به منظور محاسبه ایندکس کلیه توزین شدند.

اندازه‌گیری غلظت اوره سرم و ادرار، به روش کالریمتريک براساس دستور کیت مربوطه (شرکت بتاژن؛ ایران) و توسط دستگاه فتومنتر Convergys 100 (آلمان) در طول موج ۵۷۸ نانومتر انجام شد.

در روش مذکور، آمونیاک حاصل از هیدرولیز اوره، توسط آنزیم اوره‌آز با هیپوکلریت و سالیسیلات‌سدیم، تشکیل یک ترکیب سیزرنگ می‌دهد که شدت رنگ ایجادشده متناسب با مقدار اوره در نمونه است<sup>[12]</sup>. محلول‌ها طبق دستور شرکت سازنده (پارس‌آزمون؛ ایران) آماده شدند. برای بررسی نمونه‌های ادراری، ادرار به نسبت ۵۰+۱ با آب مقطرا، رقیق و در نهایت عدد به دست‌آمده در ضرب ۵۱ شد. اندازه‌گیری غلظت اوره سرم بدون رقیق‌سازی انجام شد.

اندازه‌گیری غلظت کراتینین سرم و ادرار به روش JAFFE، براساس دستور کیت مربوطه (شرکت بتاژن؛ ایران) و توسط دستگاه فتومنتر در طول موج ۵۰۵ نانومتر انجام شد. در این روش، کراتینین با آکالالین‌پیکرات یک کمپلکس رنگی تشکیل می‌دهد که شدت رنگ ایجادشده متناسب با مقدار کراتینین در نمونه است<sup>[14]</sup>. محلول‌ها طبق دستور شرکت سازنده (پارس‌آزمون؛ ایران) آماده شدند. برای بررسی نمونه‌های ادراری، ادرار به نسبت ۵۰+۱ با آب مقطرا، رقیق و در نهایت عدد به دست‌آمده در ۵۱ ضرب شد. اندازه‌گیری غلظت کراتینین سرم بدون رقیق‌سازی انجام شد.

به نظر می‌رسد با توجه به آسیب اکسیدانی دوکسوروپیسین بر کلیه و ایجاد استرس اکسیداتیو کلیوی، سیاهدانه با داشتن خواص آنتی‌اکسیدانی قوی بتواند در بهبود عوارض اکسیداتیو دوکسوروپیسین بر کلیه نقش قابل توجهی ایفا نماید. در بررسی‌های صورت‌گرفته در رابطه با اثرات عصاره تام سیاهدانه بر آسیب عملکردی کلیوی ناشی از دوکسوروپیسین مطالعه‌ای مشاهده نشد. با توجه به دردسترس بودن سیاهدانه و نداشتن عوارض مربوط به استفاده داروهای شیمی‌درمانی، در صورت مثبت بودن نتایج حاصل از مطالعه کمک موثری به کاهش عوارض و آسیب عملکردی کلیوی ناشی از دوکسوروپیسین و هزینه‌های مرتبط با آن خواهد شد. لذا هدف از این مطالعه، تعیین اثرات عصاره آبی- الکلی تخم سیاهدانه بر آسیب کلیوی ناشی از دوکسوروپیسین و پارامترهای عملکردی کلیه در موش‌های صحرایی بود.

## مواد و روش‌ها

این مطالعه تجربی در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام و از ۳۲ سر موش صحرایی نر ویستار با وزن  $220\text{--}300$  گرم که از اتاق حیوانات دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهیه شده بودند، استفاده شد. در طول مدت آزمایش، موش‌های صحرایی تحت شرایط استاندارد، در دمای  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  و سیکل ۱۲ ساعته روشنایی و تاریکی در اتاق حیوانات دانشکده پزشکی نگهداری شدند. حقوق حیوانات در پژوهش براساس دستورالعمل کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد رعایت شد.

عصاره آبی- الکلی سیاهدانه به روش خیسانده تهیه شد. ابتدا تخم سیاهدانه از فروشگاه معتبر داروهای گیاهی در مشهد تهیه شد و توسط متخصصان گیاه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد مورد تایید قرار گرفت. ۱۰۰ گرم از تخم‌های سیاهدانه، وزن و آسیاب شدند و سپس در  $900$  میلی‌لیتر محلول الكل اتیلیک  $70\%$  به مدت ۷۲ ساعت در دمای  $35^{\circ}\text{C}$  انکوبه شدند. بعد از ۷۲ ساعت، محلول به دست‌آمده با استفاده از صافی‌هایی با سایزهای منافذ مختلف و در نهایت کاغذ صافی، صاف شد. به منظور حذف حلال، محلول به دست‌آمده در داخل آون در دمای  $40^{\circ}\text{C}$  قرار داده شد تا حلال تبخیر شده و عصاره خشک به دست آید<sup>[12]</sup>. در این روش، بازده عصاره خشک  $30\%$  بود. برای تهیه مقادیر مختلف به منظور استفاده در آزمایش، عصاره به دست‌آمده در آب مقطرا حل شد.

موس‌های صحرایی به طور تصادفی به ۴ گروه اتابی تقسیم شدند:

۱- گروه شاهد: حیوانات با دسترسی آزاد به آب و غذا در روز هفتم مطالعه معادل حجم مورد نیاز برای تزریق دوکسوروپیسین، نرمال‌سالین به روش تزریق داخل ورید دمی دریافت کردند.

۲- گروه دوکسوروپیسین: مانند گروه شاهد، ولی تزریق تک‌دوز دوکسوروپیسین به میزان ۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم<sup>[13]</sup> به صورت داخل

گروه کنترل و گروه دوکسوروپیسین با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی و تفاوت بین روزهای مختلف در داخل گروه با استفاده از آزمون T زوجی بررسی شد.

### یافته‌ها

میانگین اوره سرم در روز ۱۰ مطالعه در گروه دوکسوروپیسین در مقایسه با میانگین روزهای قبل از تزریق دوکسوروپیسین در همان گروه افزایش معنی‌داری نشان داد ( $p < 0.05$ ). میانگین اوره سرم در روزهای مختلف سایر گروه‌های مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری را نشان نداد. کلیرنس اوره در گروه دوکسوروپیسین در روز ۲۸ نسبت به سایر روزها افزایش یافت، ولی میانگین کلیرنس اوره در روزهای مختلف سایر گروه‌های مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری را نشان نداد. میانگین گلوکز سرم در روز ۲۱ ( $p < 0.001$ ) و روز ۲۸ ( $p < 0.05$ ) مطالعه در گروه دوکسوروپیسین در مقایسه با میانگین روزهای قبل از تزریق دوکسوروپیسین در همان گروه کاهش معنی‌داری نشان داد. میانگین گلوکز سرم در روزهای مختلف سایر گروه‌های مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (جدول ۱).

اندازه‌گیری غلظت گلوکز سرم و ادرار به روش GOD-PAP، براساس دستور کیت مربوطه (شرکت بتازن؛ ایران) و توسط دستگاه فتوتمتر در طول موج ۵۴۶ نانومتر انجام شد. در این روش، آب اکسیژنه آزادشده از گلوکز در مجاورت آنزیم گلوکز‌اکسیداز با فنول و ۴-آمینوپیرین، در مجاورت آنزیم پراکسیداز تشکیل کیونینمیں می‌دهد. میزان کیونینمیں تشکیل شده که به صورت فتوتمتریک قابل اندازه‌گیری است، با مقدار گلوکز رابطه مستقیم دارد<sup>[12]</sup>.


فیلتراسیون گلومرولی معادل کلیرنس کراتینین در نظر گرفته و با فرمول "کراتینین پلاسمای (میلی‌گرم بر دسی‌لیتر)/کراتینین ادرار" (میلی‌گرم بر دسی‌لیتر)  $\times$  بروون‌ده ادراری (میلی‌لیتر در دقیقه) محاسبه شد. کلیرنس اوره با فرمول "اوره پلاسمای (میلی‌گرم بر دسی‌لیتر)/اوره ادرار (میلی‌گرم بر دسی‌لیتر)"  $\times$  بروون‌ده ادراری (میلی‌لیتر در دقیقه)<sup>۳</sup> محاسبه شد. ایندکس کلیه براساس وزن بدن حیوان در روز ۳۵ و وزن کلیه راست آنها، طبق فرمول "وزن بدن (گرم)  $\times$  ۱۰۰/وزن کلیه (گرم)" محاسبه شد.

داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور مقایسه متغیرها پس از بررسی نرمال‌بودن آنها، تفاوت با


**جدول ۱)** میانگین اوره سرم، کلیرنس اوره و گلوکز سرم در گروه‌های مختلف مورد مطالعه (تعداد هر گروه ۸سر) تحت تیمار عصاره آبی - الکلی تخم سیاهدانه (میلی‌گرم بر کیلوگرم)

شاخص	گروه شاهد	گروه دوکسوروپیسین	گروه سیاهدانه	گروه سیاهدانه+دوکسوروپیسین
<b>میانگین اوره سرم (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)</b>				
میانگین روز صفر و ۶	۵۰/۴۰±۱/۵۱	۴۳/۰۶±۰/۶۳	۵۶/۲۲±۳/۱۶	۵۵/۳۵±۲/۸۸
روز ۱۰	۵۲/۴۵±۲/۳۶	۶۲/۰۸±۰/۷۵*	۵۳/۳۸±۱/۴۹	۵۱/۸۶±۱/۱۸
روز ۱۴	۴۶/۸۵±۲/۲۹	۴۷/۰۳±۰/۷۴	۵۱/۶۶±۱/۵۹	۵۳/۵۳±۱/۹۰
روز ۲۱	۵۱/۸۲±۲/۳۴	۴۵/۰۱±۰/۹۰	۴۸/۰۹±۱/۸۱	۴۳/۸۶±۲/۲۱
روز ۲۸	۵۴/۴۰±۳/۶۷	۴۶/۰۴±۰/۲۴	۵۰/۹۱±۱/۶۴	۵۷/۴۹±۲/۰۶
روز ۳۵	۴۶/۹۳±۲/۲۲	۴۸/۰۱±۰/۴۴	۴۳/۷۳±۰/۸۸	۵۴/۱۹±۲/۲۳
<b>میانگین کلیرنس اوره (میلی‌لیتر در دقیقه)</b>				
میانگین روز صفر و ۶	۰/۴۷±۰/۰۶	۰/۶۳±۰/۱۴	۰/۲۹±۰/۰۲	۰/۲۸±۰/۰۸
روز ۱۰	۰/۴۳±۰/۱۵	۰/۳۰±۰/۰۶	۰/۳۰±۰/۰۵	۰/۳۸±۰/۰۳
روز ۱۴	۰/۴۵±۰/۰۸	۰/۷۳±۰/۱۷	۰/۲۹±۰/۰۵	۰/۲۹±۰/۰۴
روز ۲۱	۰/۶۰±۰/۱۷	۰/۹۲±۰/۱۷	۰/۳۸±۰/۰۷	۰/۶۳±۰/۰۹
روز ۲۸	۰/۴۸±۰/۱۲	۱/۰۳±۰/۲۰	۰/۲۸±۰/۰۳	۰/۵۲±۰/۰۱
روز ۳۵	۰/۵۳±۰/۰۶	۰/۹۷±۰/۱۰	۰/۳۹±۰/۱۲	۰/۵۷±۰/۰۷
<b>میانگین گلوکز سرم (میلی‌گرم بر دسی‌لیتر)</b>				
میانگین روز صفر و ۶	۱۲۹/۳۰±۷/۴۲	۱۳۰/۴۰±۰/۵۳	۱۲۲/۷۰±۵/۶۰	۱۳۰/۸۰±۵/۴۵
روز ۱۰	۱۴۵/۸۰±۵/۷۷	۱۴۸/۲۰±۱/۴۵	۱۳۴/۲۰±۸/۶۷	۱۲۰/۷۰±۳/۳۵
روز ۱۴	۱۴۶/۴۰±۳/۱۲	۱۲۳/۸۰±۱/۳۳	۱۳۱/۲۰±۴/۴۳	۱۴۵/۳۰±۳/۸۹
روز ۲۱	۱۴۳/۱۰±۹/۴۸	۱۰۷/۹۰±۰/۶۳***	۱۲۴/۹۰±۴/۶۷	۱۳۰/۸۰±۷/۳۷
روز ۲۸	۱۴۹/۰۰±۱۰/۹۲	۱۱۲/۶۰±۰/۹۱**	۱۳۳/۶۰±۳/۳۷	۱۳۰/۵۰±۶/۱۸
روز ۳۵	۱۴۰/۰۰±۶/۹۷	۱۳۷/۱۰±۲/۰۲	۱۳۸/۴۰±۱۲/۸۱	۱۲۰/۵۴±۳/۳۶

\* تفاوت با روز کنترل در همان گروه؛ \*\* تفاوت با میانگین روزهای صفر تا ۶ در داخل گروه؛ \*\*\* تفاوت با میانگین روزهای صفر تا ۶ در داخل گروه



نمودار (۱) اثر عصاره آبی-الکلی تخم سیاهدانه (۰۰۰۱< p<۰۰۰۵<sup>#</sup>) بر سطح گلوبلز ادرار در مقایسه با گروه کنترل و گروه دوکسوروپیسین  
تفاوت با گروه شاهد، <sup>###</sup>p<۰۰۰۵<sup>x</sup> تفاوت با گروه دوکسوروپیسین، <sup>\*</sup>p<۰۰۰۵<sup>#</sup> تفاوت با میانگین روزهای صفر تا ۶ در داخل گروه،  
<sup>#</sup>p<۰۰۰۱\*\*\* تفاوت با میانگین روزهای صفر تا ۶ در داخل گروه.



نمودار (۲) اثر عصاره آبی-الکلی تخم سیاهدانه (۰۰۰۱< p<۰۰۰۵<sup>#</sup>) بر میزان فیلتراسیون گلومرولی (میلی لیتر در دقیقه) در مقایسه با گروه کنترل و گروه دوکسوروپیسین (<sup>\*</sup>p<۰۰۰۵<sup>x</sup> تفاوت با گروه شاهد، <sup>###</sup>p<۰۰۰۵<sup>#</sup> تفاوت با گروه دوکسوروپیسین، <sup>\*</sup>p<۰۰۰۵<sup>#</sup> تفاوت با میانگین روزهای صفر تا ۶ در داخل گروه).

سمیت کلیوی می‌شود. مکانیزم‌های متعددی در این زمینه مطرح شده است که از آن جمله می‌توان به افزایش دفع N-استیل گلوگامین (NAG)، گلیکوز‌آمینو گلیکان (GAG)، گلوکز و فیبرونکتین از ادرار، کاهش سرعت فیلتراسیون گلومرولی (GFR) و افزایش میزان لبیدپراکسیداسیون، هیدروژن پراکسیداز و کاهش میزان آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، اشاره نمود.<sup>[16]</sup>

در مطالعه دیگری نیز تزریق داخل وریدی دوبار دوکسوروپیسین به فاصله ۱۴ روز بهمدت ۲۰ روز موجب نکروز تبوبی و از هم گسیختگی غشای گلومرولی و افزایش سطح مالون دی آلدئید و کاهش میزان گروههای تام تیول در بافت کلیه شد<sup>[17]</sup>. دانشمندان نشان دادند تزریق داخل وریدی دوکسوروپیسین به میزان عیلی گرم بر کیلوگرم موجب ایجاد التهاب و از هم گسیختگی غشای گلومرول، افزایش سطح مالون دی آلدئید و کاهش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در بافت کلیه می شود<sup>[18]</sup>. همچنین در مطالعه دیگری تجویز دوکسوروپیسین موجب ایجاد اسکلروز گلومرولی و آسیب و یکنواختی پدوسیت ها شد<sup>[19]</sup>. تحقیقات نشان داد تجویز داخل وریدی دوکسوروپیسین موجب از هم گسیختگی و کاهش تعداد زواید پایی پدوسیت ها به واسطه کاهش در بیان پروتئین های پدوسیتی نفرین و پدوسین شد<sup>[20]</sup>. مطالعات بافت شناسی کلیه، تخریب کلیوی را در گروه دوکسوروپیسین تایید می کنند. مطالعات بافت شناسی متعدد، واکوئولیزشن گلومرولی، التهاب، تخریب و ریزش سلول اپی تیالی، انساع و هیالین کست در تبوبی های کلیوی را در گروه دوکسوروپیسین نشان دادند<sup>[21]</sup>. نتایج پاتولوژی فوق می تواند تاییدی بر بروز نفروپاتی و از هم گسیختگی غشا در گلومرول های کلیه باشد.

نتایج مطالعه ما نشان داد که میانگین غلظت گلوکز ادرار در گروه سیاهدانه به همراه دوکسوروبیسین در مقایسه با گروه دوکسوروبیسین کاهش معنی داری داشت. همچنین میانگین GFR در گروه سیاهدانه به همراه دوکسوروبیسین در مقایسه با گروه دوکسوروبیسین افزایش معنی داری نشان داد که همسو با سایر نتایج به دست آمده در این زمینه است. در مطالعه انجام شده توسط الشریینی و الشریینی در سال ۲۰۱۴، تجویز خوارکی تیموکینون بهمیزان ۰.۵میلی گرم بر کیلو گرم به مدت سه هفتگه سبب بهبود آسیب توبولی و گلومرولی در رافت کاره آسیب دیدم تماس با دوکسوروبیسین شد.<sup>[22]</sup>

در مطالعات گوناگون به خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی سیاهدانه و تیموکینون به عنوان یکی از مهمترین مواد موثره سیاهدانه اشاره شده است که می‌تواند سبب بهبود وضعیت آسیب بافتی شود. از آنجا که تیموکینون دارای خواص آنتی اکسیدانی است و از طرفی سیاهدانه نیز دارای ترکیبات پلی‌فنولی است، ممکن است به علت خواص آنتی اکسیدانی که دارد موجب بهبود تخریب بافتی در نفروپاتی ناشی از سمیت ایجادشده توسط دوکسوروپیسین شود که هماهنگ با بافتهای، ما در بدهش، حاضر است.

میانگین غلظت گلوکز ادرار در روز ۲۸ ( $p < 0.001$ ) و روز ۳۵ ( $p < 0.05$ ) مطالعه در گروه دوکسوروبیسین در مقایسه با میانگین روزهای قبل از تزریق دوکسوروبیسین در همان گروه افزایش معنی داری نشان داد. میانگین غلظت گلوکز ادرار در روز ۱۴ مطالعه در گروه سیاهدانه در مقایسه با میانگین روزهای قبل از تزریق دوکسوروبیسین در همان گروه کاهش معنی داری نشان داد ( $p < 0.05$ ). میانگین غلظت گلوکز ادرار در روز ۲۸ مطالعه در گروه دوکسوروبیسین در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری نشان داد ( $p < 0.001$ ). میانگین غلظت گلوکز ادرار در روز ۲۸ مطالعه در گروه سیاهدانه + دوکسوروبیسین در مقایسه با گروه دوکسوروبیسین کاهش معنی داری نشان داد ( $p < 0.05$ ): نمودار ۱.

میانگین GFR در روزهای ۲۱ و ۳۵ مطالعه در گروه دوکسوروبیسین در مقایسه با روز کنترل در همان گروه کاهش معنی داری نشان داد ( $p < 0.05$ ). میانگین GFR در روز ۳۵ مطالعه در گروه دوکسوروبیسین در مقایسه با گروه شاهد نیز کاهش معنی داری نشان داد ( $p < 0.05$ ). میانگین GFR در روزهای ۲۸، ۲۱ و ۳۵ مطالعه در گروه سیاهدانه + دوکسوروبیسین در مقایسه با گروه دوکسوروبیسین افزایش معنی داری نشان داد ( $p < 0.05$ ): نمودار ۲.

درصد ایندکس کلیه در گروه دوکسوروبیسین ( $50 \pm 7/5$ ) در مقایسه با گروه شاهد ( $34 \pm 6/6$ ) افزایش معنی داری نشان داد ( $p < 0.05$ ) ولی این افزایش در گروه های سیاهدانه ( $2/1 \pm 8/38$ ) و سیاهدانه + دوکسوروبیسین ( $5/5 \pm 7/5$ ) معنی دار نبود.

دخت

نتایج مطالعه حاضر به طور مشخصی نشان داد که در گروه دوکسوروپیسین، از هفته‌های ابتدایی پس از تزریق، افزایش در میزان گلوکز ادرار وجود داشت که احتمالاً افزایش میزان گلوکز ادرار در هفته‌های انتهایی پس از تجویز دوکسوروپیسین مربوط به دفع گلوکز در ادرار به دنبال نفوropاتی ایجادشده ناشی از دوکسوروپیسین است. تجویز عصاره سیاهدانه به همراه دوکسوروپیسین موجب کاهش میزان گلوکز ادرار در هفته‌های انتهایی پس از تجویز دوکسوروپیسین نسبت به روزهای مشابه در گروه دوکسوروپیسین شد که عصاره سیاهدانه به دلیل دارای بودن اثرات آنتیاکسیدانی قوی، نقش موثر در بهبود دهنگی میزان گلوکز افزایش یافته به دنبال گلوکوزوری ناشی از نفوropاتی در موش‌های صحیح ای، تینا شده با دوکسوروپیسین، داشت.

میانگین GFR در گروه دوکسوروپیسین در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی داری داشت که این نتایج همso با نتایج سایر مطالعات انجام شده در این زمینه است. در یکی از مطالعات نشان داده شد که دوکسوروپیسین باعث کاهش GFR می شود<sup>[15]</sup>. مطابق با مطالعات قلی، در این مطالعه نشان داده شد که دوکسوروپیسین موجب

### نتیجه‌گیری

عصاره آبی - الکلی تخم سیاهدانه، آسیب عملکرد کلیوی ناشی از دوکسوروپیسین در موش‌های صحرایی را کاهش داده و سبب بهبود میزان GFR و کاهش گلوکوزوری می‌شود.

**تشکر و قدردانی:** نویسنده‌گان بر خود لازم می‌دانند که از حمایت‌های بی‌دریغ معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سپاسگزاری نمایند.

**تعارض منافع:** توسط نویسنده‌گان بیان نشده است.  
**تاییدیه اخلاقی:** از کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اخذ شده است.

**منابع مالی:** این مقاله حاصل یک طرح تحقیقاتی است و از حمایت‌های مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برخوردار بوده است.

### منابع

- 1- Lee VW, Harris DC. Adriamycin nephropathy: A model of focal segmental glomerulosclerosis. *Nephrol. 2011;16(1):30-8.*
- 2- Balakumar P, Chakkarwar VA, Kumar V, Jain A, Reddy J, Singh M. Experimental models for nephropathy. *J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2008;9(4):189-95.*
- 3- Jeansson M, Björck K, Tenstad O, Haraldsson B. Adriamycin alters glomerular endothelium to induce proteinuria. *J Am Soc Nephrol. 2009;20(1):114-22.*
- 4- Venkatesan N, Punithavathi D, Arumugam V. Curcumin prevents adriamycin nephrotoxicity in rats. *Br J Pharmacol. 2000;129(2):231-4.*
- 5- Ali BH, Blunden G. Pharmacological and toxicological properties of *Nigella sativa*. *Phytother Res. 2003;17(4):299-305.*
- 6- Salem ML. Immunomodulatory and therapeutic properties of the *Nigella sativa* L. seed. *Int Immunopharmacol. 2005;5(13-14):1749-70.*
- 7- Boskabady MH, Shirmohammadi B, Jandaghi P, Kiani S. Possible mechanism(s) for relaxant effect of aqueous and macerated extracts from *Nigella sativa* on tracheal chains of guinea pig. *BMC Pharmacol. 2004;4:3.*
- 8- Randhawa MA. Black seed, *Nigella sativa*, deserves more attention. *J Ayub Med Coll Abbottabad. 2008;20(2):1-2.*
- 9- Gilani A-uH, Jabeen Q, Allah Khan MA. A review of medicinal uses and pharmacological activities of *Nigella sativa*. *Pak J Biol Sci. 2004;7(4):441-51.*
- 10- Uz E, Bayrak O, Kaya A, Bayrak R, Uz B, Turgut FH, et al. *Nigella sativa* oil for prevention of chronic cyclosporine nephrotoxicity: An experimental model. *Am J Nephrol. 2008;28(3):517-22.*
- 11- Yaman I, Balikci E. Protective effects of *Nigella sativa* against gentamicin-induced nephrotoxicity in rats. *Exp Toxicol Pathol. 2010;62(2):183-90.*
- 12- Burtis C, Ashwood E, Bruns D. *Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics*. New York: Elsevier Health Sciences; 2015.

در بررسی حاضر، افزایش معنی‌دار ایندکس کلیه در گروه دوکسوروپیسین نسبت به گروه شاهد، به علت افزایش وزن کلیه و کاهش تقریبی وزن بدن ایجاد شد. کاهش وزن بدن می‌تواند به علت کاهش مصرف و جذب غذا ناشی از سمیت گوارشی به‌شکل تهوع، استفراغ و اسهال ایجاد شود. افزایش وزن کلیه می‌تواند ناشی از ادم بافتی و تجمع مایع در فضای میان‌بافتی کلیه به‌دلیل افزایش فشار اسمزی - کلولئیدی مایع میان‌بافتی باشد. احتمالاً دوکسوروپیسین با اثرات اکسیداتیو خود موجب آسیب سلول‌های اندوتیال عروق در کلیه و نشت پروتئین‌ها از درون رگ به مایع میان‌بافتی می‌شود<sup>[23]</sup>. اثرات التهاب‌زاوی دوکسوروپیسین نیز می‌تواند منجر به ایجاد التهاب و افزایش وزن در بافت کلیه شده و از این طریق وزن کلیه را افزایش دهد<sup>[24]</sup>. اثرات مطلوب عصاره سیاهدانه بر افزایش ایندکس کلیوی ناشی از دوکسوروپیسین احتمالاً می‌تواند به‌دلیل اثرات متعدد آن از جمله خواص آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی، تنظیم‌کننده ایمنی و ضدآپوپتوزی باشد<sup>[25]</sup>. کاهش وزن بدن و کلیه در مدل‌های حیوانی تزریق دوکسوروپیسین در مطالعه انجام‌شده توسط محققان نشان داده شده است که تزریق داخلی وریدی دوبار دوکسوروپیسین به‌فاصله ۱۴ روز به‌مدت ۲۰ روز موجب کاهش معنی‌داری در وزن حیوانات تیمارشده با دوکسوروپیسین شد<sup>[20]</sup>. در مطالعه‌ای که روی موش‌های صحرایی صورت گرفت مشخص شد که تجویز دوکسوروپیسین سبب کاهش در وزن حیوانات تحت تیمار با دوکسوروپیسین شد<sup>[26]</sup>.

استرس اکسیداتیو نقش مهمی در نفوپاتی ناشی از دوکسوروپیسین ایفا می‌کند. این عامل به‌وسیله صدمه گشاش‌های گلومرولی از طریق صدمه سلول‌های اندوتیال، سلول‌های پدوسیت و غیره باعث نفوپاتی می‌شود. مطالعات زیادی انجام شده که نشان می‌دهد دوکسوروپیسین روی آنزیم‌های استرس اکسیداتیو تاثیر دارد<sup>[27]</sup>. نتایج این مطالعه نشان‌دهنده تاثیر پیشگیرانه عصاره سیاهدانه بر فعالیت اکسیدانی دوکسوروپیسین در بافت کلیه بود. علت خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره سیاهدانه ممکن است مربوط به وجود مواد تیموکینون به‌میزان ۵۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم به‌مدت سه هفته سبب کاهش استرس اکسیداتیو و افزایش میزان آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی از قبیل سوپراکسیدیسموتاز و کاهش میزان التهاب بافتی از طریق کاهش تولید TNF-α (فاكتور نکروزه‌دهنده تومور آلفا) و ایترولاکین ۶ در بافت کلیه آسیب‌دیده توسط دوکسوروپیسین شد<sup>[22]</sup>.

از محدودیت‌های این مطالعه زمان‌بربودن تهیه عصاره سیاهدانه بود. پیشنهاد می‌شود که دوزهای دیگری از سیاهدانه با روش‌های تجویز و دوره‌های زمانی متفاوت نیز کار شود.

- rats: An experimental research. *Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi*. 2014;34(2):203-8.
- 21- Wei M, Sun W, He W, Ni L, Cai X, Cheng Z, et al. Qiguiyishen decoction reduced the accumulation of extracellular matrix in the kidneys of rats with adriamycin-induced nephropathy. *J Tradit Chin Med*. 2014;34(3):351-6.
- 22- Elsherbiny NM, El-Sherbiny M. Thymoquinone attenuates Doxorubicin-induced nephrotoxicity in rats: Role of Nrf2 and NOX4. *Chem Biol Interact*. 2014;223C:102-8.
- 23- Hommel E, Mathiesen ER, Aukland K, Parving HH. Pathophysiological aspects of edema formation in diabetic nephropathy. *Kidney Int*. 1990;38(6):1187-92.
- 24- You H, Lu Y, Gui D, Peng A, Chen J, Gu Y. Aqueous extract of Astragalus Radix ameliorates proteinuria in adriamycin nephropathy rats through inhibition of oxidative stress and endothelial nitric oxide synthase. *J Ethnopharmacol*. 2011;134(1):176-82.
- 25- Kawamori T, Lubet R, Steele VE, Kelloff GJ, Kaskey RB, Rao CV, et al. Chemopreventive effect of curcumin, a naturally occurring anti-inflammatory agent, during the promotion/progression stages of colon cancer. *Cancer Res*. 1999;59(3):597-601.
- 26- Franco R, Gut A, Ferrari-Spadotto A, Georgette J, Gavras I, Gavras H. Pressor mechanisms in adriamycin-induced nephropathy with hypertension in rats. *Hypertens*. 1994;23(1):246-9.
- 27- Koul A, Shubrant S, Gupta P. Phytomodulatory potential of lycopene from *Lycopersicum esculentum* against doxorubicin induced nephrotoxicity. *Indian J Exp Biol*. 2013;51(8):635-45.
- 28- Jadhav VB, Thakare VN, Suralkar AA, Naik SR. Ameliorative effect of *Luffa acutangula* Roxb. on doxorubicin induced cardiac and nephrotoxicity in mice. *Indian J Exp Biol*. 2013;51(2):149-56.
- 13- Zima T, Tesar V, Crkovska J, Stejskalová A, Platenik J, Teminova J, et al. ICRF-187 (dexrazoxane) protects from adriamycin-induced nephrotic syndrome in rats. *Nephrol Dial Transplant*. 1998;13(8):1975-9.
- 14- Chromý V, Rozkošná K, Sedlák P. Determination of serum creatinine by Jaffe method and how to calibrate to eliminate matrix interference problems. *Clin Chem Lab Med*. 2008;46(8):1127-33.
- 15- Montilla P, Tunez I, Munoz MC, Lopez A, Soria JV. Hyperlipidemic nephropathy induced by adriamycin: effect of melatonin administration. *Nephron*. 1997;76(3):345-50.
- 16- Di Marco A, Arcamone F, Zunino F. Daunomycin (daunorubicin) and adriamycin and structural analogues: biological activity and mechanism of action. In: Corcoran JW, Hahn FE. *Mechanism of Action of Antimicrobial and Antitumor Agents Antibiotics*. New York: Springer Science & Business Media; 2012.
- 17- Sarhan M, El Serougy H, Hussein AM, El-Dosoky M, Sobh MA, Fouad SA, et al. Impact of bone-marrow-derived mesenchymal stem cells on adriamycin-induced chronic nephropathy. *Can J Physiol Pharmacol*. 2014;92(9):733-43.
- 18- Liang Cl, Wu Jb, Lai J, Ye S, Lin J, Ouyang H, et al. Protection effect of Zhen-Wu-Tang on Adriamycin-Induced Nephrotic syndrome via inhibiting oxidative lesions and inflammation damage. *Evid Based Complement Altern Med*. 2014;2014:1-11.
- 19- Zhu C, Xuan X, Che R, Ding G, Zhao M, Bai M, et al. Dysfunction of the PGC-1alpha-mitochondria axis confers adriamycin-induced podocyte injury. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2014;306(12):1410-7.
- 20- Wang Z, Liu JT, Sun WS, Li RP, Wang Y. Effect of Qufeng Tongluo Recipe on expression of desmin and CD2AP proteins in adriamycin-induced nephropathy