



Comparison of the Effect of *Echium amoenum* with Buspirone on the Anxiety of Cruciate Maze in Adult Male Rats

ARTICLE INFO

Article Type

Original Research

Authors

Javid Z.¹ MSc,
Hosseini S.E.* PhD

How to cite this article

Javid Z, Hosseini S.E. Comparison of the Effect of *Echium amoenum* with Buspirone on the Anxiety of Cruciate Maze in Adult Male Rats. *Quarterly of the Horizon of Medical Sciences*. 2016;22(1):51-56.

ABSTRACT

Aims Chemical compounds of *Echium amoenum* extract is effective in the treatment of anxiety. The present study was conducted with the aim of comparing the effect of aqueous extract of *Echium amoenum* with Buspirone which is widely used in treatment of anxiety disorders.

Materials & Methods In this experimental study, 80 adult male rats were divided randomly into 2 parts of acute and chronic treatment each part with 5 groups (each 8 mice) including control (without treatment), sham (receiving sterilized water as drug solvent) and 3 experimental groups which received Buspirone, *Echium amoenum* hydroalcoholic extract and Buspirone+*Echium amoenum* hydroalcoholic extract. All treatments were performed for 7 days in acute and for 14 days in chronic group. Cruciate-maze test was used to measure anxiety and the time and frequency of rats' presence in the open and closed levers of the maze were recorded. Data were analyzed in SPSS 18 software using one-sided ANOVA and Tukey's statistical tests.

Findings In acute groups, the means level of anxiety in *Echium amoenum* ($p<0.001$), Buspirone ($p<0.0001$) and Buspirone+*Echium amoenum* ($p<0.0001$) groups were reduced significantly compared to the control group, but the anti-anxiety effect of *Echium amoenum* was significantly less than Buspirone and Buspirone+*Echium amoenum*. In chronic groups, the means level of anxiety were reduced in all experimental groups compared to the control group ($p<0.0001$).

Conclusion Buspirone and *Echium amoenum* extract both cause the reduction of anxiety level and the effect of *Echium amoenum* increase by increasing the time of treatment period.

Keywords Buspirone; *Echium*; Anxiety; Rats

CITATION LINKS

- [1] Differences between trait fear and ... [2] Characteristics of depression in hemodialysis patients: Symptoms ... [3] Depression, anxiety, and physical impairments and quality of life in ... [4] The effectiveness of drug therapy, relaxation and compound therapy on ... [5] The relationship between job-anxiety and trait-anxiety-a differential diagnostic investigation with ... [6] Anxiolytic effects of repeated treatment with an essential oil from *Lippia alba* and ... [7] Efficacy of aqueous extract of *Echium amoenum* L. in the treatment of ... [8] Antiviral activity of borage ... [9] Moderate treadmill exercise prevents oxidative stress-induced anxiety-like behavior in ... [10] Neurobehavioral effect of essential oil of *Cymbopogon citratus* in ... [11] Phytochemical inventory of indigenous Boraginaceae: study of alkaloids and polyphenolic compounds ... [12] Use of natural antioxidants from lyophilized water extracts of *Borago officinalis* in ... [13] The aqueous extract of *Ziziphora persica* cause positive mood on ... [14] Anxiolytic effect of *Echium amoenum* during different treatment ... [15] *Echium Amoenum* Fisch et mey: A review on its pharmacological and medicinal ... [16] Effects of methanolic extract of *Echium amoenum* Fisch & Mey on seizure induced by picrotoxin in ... [17] A lack of tolerance to the anxiolytic action of *Echium* ... [18] Effect of *Echium amoenum* Fisch et mey a traditional ... [19] The effect of *Echium amoenum* hydro-alcoholic extract on blood glucose level, lipid profile and lipoproteins in ... [20] Pharmacologic treatment of anxiety disorders in children and ... [21] Acute buspirone abolishes the expression of behavioral dopaminergic supersensitivity in ... [22] Effects of oral and intravenous administration of buspirone on food-coke choice in socially housed male ... [23] Effect of buspirone on morphine withdrawal ... [24] A randomized double blind crossover study on ... [25] Anxiolytic effect of *Borago* ... [26] The effects of alcoholic extract of ... [27] A preliminary randomized double blind ... [28] Protective effects of pseudoginsenoside-F11 on ... [29] The serotonin-1A receptor in ... [30] Pindolol augmentation of ... [31] Reduced serotonin-1A receptor ... [32] High occurrence of mood and anxiety disorders among older adults: The ...

*Biology Department, Science Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

¹Psychology Department, Human Sciences Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

Correspondence

Address: Science Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Kilometer 5 of Sadra Road, Shiraz, Iran
Phone: +987143311148
Fax: +987143311172
ebrahim.hossini@yahoo.com

Article History

Received: July 5, 2015
Accepted: November 14, 2015
ePublished: December 15, 2015

مقایسه اثر گل گاوزبان و داروی بوسپیرون بر اضطراب ناشی از ماز صلیبی در موش‌های صحرایی نر بالغ

زنیب جاوید

گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

سیدابراهیم حسینی*

گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

اهداف: امروزه بهخوبی مشخص شده که ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره گل گاوزبان در درمان اضطراب موثر است. این مطالعه با هدف مقایسه اثر خداضطرابی عصاره گل گاوزبان با داروی بوسپیرون که در درمان اختلالات اضطرابی کاربرد فراوانی دارد انجام شد.

مواد و رووش‌ها: در این مطالعه تجربی، از ۸۰ سر موش صحرایی نر بالغ استفاده شد. موش‌ها بهطور تصادفی به دو دسته تحت تیمار حاد و مزمن و هر دسته به ۵ گروه لاتیپ شامل گروه‌های کنترل (فاقد تیمار)، شاهد (دریافت‌کننده آب مقطّر بهعنوان حلال دارو) و سه دسته تجربی دریافت‌کننده بوسپیرون، دریافت‌کننده عصاره گل گاوزبان کلی گل گاوزبان و دریافت‌کننده بوسپیرون همراه با عصاره گل گاوزبان تقسیم شدند. کلیه تیمارها در گروه حاد بهمدت ۷ روز و در گروه مزمن بهمدت ۱۴ روز اعمال شد. برای سنجش اضطراب از آزمون ماز صلیبی استفاده شد و مدت زمان و تعداد دفعات حضور موش‌ها در بازوی‌های باز و بسته ماز مشخص شد. نتایج توسط نرمافزار SPSS 18 و با کمک آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون پیگیری توکی مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در دسته حاد، میزان اضطراب در گروه‌های دریافت‌کننده گل گاوزبان ($p < 0.001$) و بوسپیرون بهنهایی و بوسپیرون با گل گاوزبان ($p < 0.001$) نسبت به گروه کنترل بهطور معنی‌داری کاهش یافت، ولی اثر خداضطرابی عصاره گل گاوزبان بهنهایی بهطور معنی‌داری کمتر از بوسپیرون بهنهایی و همراه با گل گاوزبان بود. در دسته مزمن در تمام گروه‌های تجربی میزان اضطراب نسبت به گروه کنترل کاهش یافت ($p < 0.001$).

نتیجه‌گیری: بوسپیرون و عصاره گل گاوزبان هر دو باعث کاهش میزان اضطراب می‌شوند و اثر گل گاوزبان با افزایش دوره درمان بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: بوسپیرون، گل گاوزبان، اضطراب، موش صحرایی

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

*نویسنده مسئول: ebrahim.hossini@yahoo.com

مقدمه

اضطراب یکی از بیماری‌های شایع روانی است که همراه با اختلالات جسمانی و کاهش خواب و بی‌قراری است^[۱]. حادث

— مقایسه اثر گل گاوزبان و داروی بوسپیرون بر اضطراب ناشی از ماز صلبیبی در موش‌های صحرایی نر بالغ ۵۳
مزمن بهمدت ۱۴ روز اعمال شد. در طول دوره آزمایش و قبل از آن با تنظیم دمای محیط و طول دوره‌های تاریک و روشن، تامین آب و غذای کافی، سکوت محیط آزمایشگاه و با در دست‌گیری و نوازش حیوانات سعی شد که تا حد امکان استرسی بر آنها وارد نشود. در این برسی حیوانات به طور نامحدود از آب لوله‌کشی شهر شیراز و غذای فشرده (شرکت خوراک دام پارس‌تهران؛ ایران) استفاده نمودند. پروتکل تحقیق براساس قوانین بین‌المللی در مورد حیوانات آزمایشگاهی تنظیم شد و در کمیته اخلاق دانشگاه به تصویب رسید.

برای تهیه عصاره گل گاوزبان از روش پرکولاسیون استفاده شد. برای این کار به مقدار کافی گل گاوزبان از نواحی شمال ایران تهیه شد و پس از خشکنمودن، در آب خیسانده شد و آن گاه به کمک دستگاه همزن به خوبی هم زده شد تا به حالت یکنواخت درآید. سپس ۲۰۰ گرم از مخلوط یکنواخت به دست آمده در ۳۲۰ میلی‌لیتر کل ۷۰ درجه ریخته شد تا در دمای آزمایشگاه به مدت ۴۸ ساعت و دور از نور به خوبی خیسانده شود. سپس به سیله فیلتر صاف شده و توسط دستگاه روتاری مخلوط حاصل تغییظ شد و به کمک دستگاه دسیکاتور تمام رطوبت مخلوط گرفته شد و عصاره‌ای با ویسکوزیته بالا به دست آمد.^[25]

حیوانات گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفتند. حیوانات گروه‌های شاهد در دسته‌های حاد و مزمم به ترتیب به مدت ۷ و ۱۴ روز، روزانه یک میلی‌لیتر آب مقطمر و گروه‌های تجربی نیز به طور مشابه با گروه شاهد از نظر زمانی داروهای بوسپیرون، عصاره گل گاوزبان و بوسپیرون به همراه عصاره گل گاوزبان با دوزهای فوق به صورت درون‌صفاقی قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری میزان اضطراب در حیوانات، در پایان روز هفتم در گروه تحت تیمار حاد و در پایان روز چهاردهم در گروه تحت تیمار مزمم بعد از تجویزها، از مدل تست ماز صلبیبی که مدل استاندارد ارزیابی میزان اضطراب در جوندگان است استفاده شد. ماز صلبیبی و سیله‌ای از جنس پلکسی‌گلاس و دارای دو بازوی باز به ابعاد $5 \times 30 \times 30$ سانتی‌متر و دو بازوی بسته $5 \times 5 \times 15$ سانتی‌متری است که در مقابل هم قرار دارند و به سیله یک صفحه مرکزی 5×5 سانتی‌متر با هم در ارتباط هستند و به ارتفاع 5 سانتی‌متری از سطح زمین قرار دارد. این مدل سنجش اضطراب، غیرشرطی است و نیازی به آموزش و یادگیری ندارد. ۳۰ دقیقه پس از آخرین تزریق، موش‌ها به آرامی و به طوری که سر حیوان به سمت بازوی باز باشد در مرکز ماز قرار داده شدند و به مدت ۵ دقیقه تعداد رفت و برگشت موش‌ها به سیله شخصی که نسبت به نوع مداخله اطلاعات خاصی نداشت توسط دوربین فیلمبرداری ثبت شد و تعداد دفعات داخل شدن حیوانات بر بازوی داری باز و بسته و همچین مجموع زمان صرف شده در بازوی داری باز و بسته محاسبه شد. در این آزمون، افزایش مدت زمان حضور و تعداد دفعات ورود موش‌ها در بازوی داری باز با سطح اضطراب رابطه منفی و

است.^[18] عصاره هیدروالکلی گل گاوزبان ایرانی دارای اثرات هیبوگلایسمیک در موش‌های صحرایی دیابتی است و می‌تواند منجر به تغییرات سودمند در سطوح لیپیدها و لیپوپروتئین‌های پلاسمایی شود.^[19]

بوسپیرون به عنوان آگونیست گیرنده‌های 5-HT_{1A} سروتونین و گیرنده‌های پیش‌سیناپسی دوپامین و آلفا-۱-آدرنرژیک به حساب می‌آید.^[20] اخیراً گزارش شده است که تجویز همزمان بوسپیرون با هالوپریدول باعث تقویت اثر داروی هالوپریدول در توقف فعالیت‌های دوپامینرژیک می‌شود.^[21] نشان داده شده است که بوسپیرون به عنوان آگونیست گیرنده‌های پیش‌سیناپسی دوپامین باعث کاهش واپستگی می‌میمون‌های معتاد به کوکائین می‌شود.^[22] نتایج مطالعات متعدد حاکی از دخالت اعصاب سروتونرژیک در بروز تحمل و واپستگی به مورفين هستند و بوسپیرون به طور قابل توجهی می‌تواند شدت عالیم ترک را در موش‌های واپسته به مورفين کاهش دهد.^[23] بوسپیرون در بهبود کیفیت زندگی، علامت سیری زودرس و درد شکمی در بیماران سوء‌های اعصاب عملکردی و در درمان اختلال بیش‌فعالی و کمیود توجه، با عوارض جانبی کمتر، بهاندازه مตبل فنیدیت موثر است.^[24] بوسپیرون دارویی است که تمایل زیادی به گیرنده‌های سروتونینی داشته و تمایل نسبی برای افزایش تولید و ترشح دوپامین و بر گیرنده‌های آلفا-۱-آدرنرژیک دارد.^[20]

با توجه به شیوع اختلالات اضطرابی در سراسر جهان و اثرات سوء بسیاری از داروهای ضداضطرابی که در روان‌پزشکی کاربرد دارند، این مطالعه با هدف مقایسه اثر ضداضطرابی عصاره گل گاوزبان (که دارای اثرات جانبی گزارش شده‌ای نیست) با داروی بوسپیرون که در درمان اختلالات اضطرابی کاربرد فراوانی دارد انجام شد.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه تجربی که در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام گرفت، از ۸۰ سر موش صحرایی نر بالغ با محدوده وزنی $180-200$ گرم که از مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شده بودند استفاده شد. تمام حیوانات در درجه حرارت $22 \pm 2^\circ\text{C}$ و در شرایط نوری ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی نگهداری شدند. موش‌ها به طور تصادفی به دو دسته تحت تیمار حاد و مزمم تقسیم شدند و هر دسته به ۵ گروه اتابی شامل گروه‌های کنترل (فاقد تیمار)، شاهد (دربافت‌کننده آب مقطمر به عنوان حلال دارو) و سه دسته تجربی دربافت‌کننده بوسپیرون با دوز ۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم، عصاره هیدروالکلی گل گاوزبان با دوز ۱۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم^[25] و گروه دربافت‌کننده بوسپیرون با دوز ۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم همراه با عصاره هیدروالکلی گل گاوزبان با دوز ۱۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. کلیه تیمارها در گروه حاد به مدت ۷ روز و در گروه

و همراه با عصاره گل گاوزبان تفاوت معنی داری وجود نداشت، ولی اثر ضداضطرابی عصاره گل گاوزبان به تهایی به طور معنی داری کمتر از بوسپیرون به تهایی و همراه با عصاره گل گاوزبان در درصد زمان سپری شده در بازوی باز ماز بود ($p < 0.001$). برعلاوه به دنبال ۱۴ روز تجویز درون صفاقی داروی بوسپیرون، عصاره گل گاوزبان و بوسپیرون به همراه عصاره گل گاوزبان افزایش معنی داری در درصد زمان سپری شده و دفعات ورود به بازوی باز ماز صلبی و همچنین کاهش معنی داری در درصد زمان سپری شده و دفعات ورود به بازوی بسته ماز صلبی مشاهده شد ($p < 0.001$) که نشان دهنده کاهش میزان اضطراب در مoshها و افزایش اثر درمانی گل گاوزبان با افزایش زمان مصرف بود و تفاوت معنی داری در بین گروه های تجربی مختلف مشاهده نشد (جدول ۱).

مدت زمان و دفعات حضور موشها در بازو های بسته با سطح اضطراب رابطه مثبت دارد [۲۶].

نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون پیگیری توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

۷ روز تجویز درون صفاقی داروی بوسپیرون به تهایی و بوسپیرون به همراه عصاره گل گاوزبان باعث افزایش معنی دار درصد زمان سپری شده و دفعات ورود به بازوی باز ماز صلبی و کاهش معنی دار درصد زمان سپری شده و دفعات ورود به بازوی بسته ماز صلبی شد ($p < 0.001$). همچنین بین اثرات ضداضطرابی بوسپیرون به تهایی

جدول ۱) میانگین درصد زمان سپری شده و درصد دفعات ورود در بازو های باز و بسته ماز صلبی در گروه های مختلف، ۷ و ۱۴ روز پس از تجویز

درصد زمان سپری شده				درصد دفعات ورود	درصد دفعات ورود	گروه های مورد مطالعه
دسته تحت تیمار حاد	در بازوی باز	به بازوی بسته	دسته تحت تیمار مزمن	در بازوی باز	به بازوی باز	
کنترل	۷۹/۵۱±۱/۵۷	۲۰/۳۹±۱/۵۷	۸۳/۹۵±۲/۶۹	۱۶/۰۵±۲/۶۹		
شاهد	۷۸/۶۸±۲/۱۸	۲۱/۲۲±۲/۲۸	۸۴/۴۴±۱/۱۷۹	۱۵/۵۷±۱/۷۹		
تجربی ۱ (بوسپیرون)	۳۳/۴۶±۴/۳۲**	۵۶/۵۴±۵/۴۲**	۲۸/۲۹±۱/۷۰**	۷۱/۷۱±۱/۷۰**		
تجربی ۲ (عصاره گل گاوزبان)	۵۶/۵۰±۳/۶۹*	۴۳/۵۰±۴/۷۹*	۶۱/۵۲±۱/۸۴*	۳۸/۴۸±۱/۸۴**\$		
تجربی ۳ (عصاره گل گاوزبان+بوسپیرون)	۳۲/۲۵±۶/۵۲**	۵۷/۶۵±۷/۷۹**	۲۵/۷۱±۳/۹۶**	۷۴/۲۸±۳/۹۶**		
با گروه کنترل حاد یا مزمن: * $p < 0.05$ با گروه مشابه حاد؛ ** $p < 0.01$ با گروه مشابه حاد؛ # $p < 0.05$ با گروه مشابه حاد؛ & $p < 0.01$ با گروه مشابه حاد؛ \$ $p < 0.05$ با گروه کنترل حاد یا مزمن.						

داده شده است. همچنین در این مطالعه هیچ گونه مورتالیتی در حیوانات گزارش نشده است [۱۹]. در یک مطالعه روی بیماران افسرده خفیف تا متوسط اثرات ضد افسردگی گل گاوزبان در طول درمان به اثبات رسیده است [۷]. بر طبق نتایج مطالعات، عصاره هیدرولالکلی گل گاوزبان با افزایش سطح دوپامین می تواند اثرات ضد اضطرابی داشته باشد و همچنین از طریق تعديل عملکرد سیستم های عصبی سروتونرژیک که نقش بسیار مهمی در اختلالات عصبی اضطراب و افسردگی بازی می نمایند، باعث کاهش میزان اضطراب می شود [۱۳]. مطالعات رفتاری، آسیب شناختی و فیزیولوژیک به نقش اساسی گیرنده های سروتونین، به خصوص ریپتورهای خانواده ۵HT_{1A} در اختلالات خلقی نظری افسردگی و اضطراب اشاره دارند و اخیراً نیز دریافت هایند که کاهش سطح گیرنده های ۵HT_{1A} باعث افزایش اضطراب می شود [۲۹]. در میان تمام گیرنده های سروتونین، گیرنده

بحث

نتایج این مطالعه بیانگر آن است که مصرف حاد و مزمن بوسپیرون و همچنین عصاره هیدرولالکلی گل گاوزبان باعث افزایش درصد زمان سپری شده و تعداد دفعات ورود در بازوی باز ماز صلبی می شود و با افزایش دوره درمان تاثیر عصاره گل گاوزبان افزایش می یابد. به عبارت دیگر، این دو وضعیت نشان دهنده آن است که مصرف حاد و مزمن بوسپیرون و عصاره هیدرولالکلی گل گاوزبان باعث کاهش بروز رفتارهای شباه اضطرابی در مoshها می شود. نتایج به دست آمده در این مطالعه با برخی از تحقیقات قبلی همسویی دارد [۱۴، ۱۷، ۲۵، ۲۷، ۲۸] ساپوینین ترکیبی است که باعث بهبود حافظه و کاهش سطح اضطراب می شود [۲۸]. لذا در توجیه خاصیت ضد اضطرابی و آرامبخشی، می توان به ساپوینین که یکی از محظوظات گل گاوزبان است، اشاره کرد. در یک بررسی، اثرات ضد اضطرابی ناشی از تزریق عصاره آبی گل گاوزبان ایرانی به موش های سوری نر نشان

- 55
- 4- Hosseini E, Tadayon Z. The effectiveness of drug therapy, relaxation and compound therapy on anxiety reduction, level of epinephrine and norepinephrine among patients with generalized anxiety disorder. *Pars J Med Sci.* 2013;10(4):61-8. [Persian]
- 5- Muschalla B, Linden M, Olbrich D. The relationship between job-anxiety and trait-anxiety-a differential diagnostic investigation with the Job-Anxiety-Scale and the State-Trait-Anxiety-Inventory. *J Anxiety Disord.* 2010;24(3):366-71.
- 6- Hatano VY, Torricelli AS, Giassi AC, Coslopo LA, Viana MB. Anxiolytic effects of repeated treatment with an essential oil from Lippia alba and (R)-(-)-carvone in the elevated T-maze. *Braz J Med Biol Res.* 2012;45(3):238-43.
- 7- Saiah Bargard M, Asadi M, Amini H, Saiah M, Akondzadeh Sh, Kamalianejad M. Efficacy of aqueous extract of Echium amoenum L. in the treatment of mild to moderate major depressive disorder: A randomized double blind clinical trial. *J Med Plant.* 2004;10(3):61-70. [Persian]
- 8- Abolhassani M. Antiviral activity of borage (Echium amoenum). *Arch Med Sci.* 2010;6(3):366-9.
- 9- Salim S, Sarraj N, Taneja M, Saha K, Tejada-Simon MV, Chugh G. Moderate treadmill exercise prevents oxidative stress-induced anxiety-like behavior in rats. *Behav Brain Res.* 2010;208(2):545-52.
- 10- Blanco MM, Costa CA, Freire AO, Santos JJ, Costa M. Neurobehavioral effect of essential oil of Cymbopogon citratus in mice. *Phytomedicine.* 2009;16(2-3):265-70.
- 11- Delorme P, Jay M, Ferry S. Phytochemical inventory of indigenous Boraginaceae: study of alkaloids and polyphenolic compounds (antho cyanic and flavonic compounds). *Plantes Medicinales et Phytotherapie.* 1977;11(1):5-11.
- 12- Ciriano MG, Garcia-Herreros C, Larequi E, Valencia I, Ansorena D, Astiasaran I. Use of natural antioxidants from lyophilized water extracts of Borago officinalis in dry fermented sausages enriched in omega-3 PUFA. *Meat Sci.* 2009;83(2):271-7.
- 13- Faryadyan P, Khosravi A, Faryadian S, Kashiri M, Valizadeh R. The aqueous extract of ziziphora persica cause positive mood on depressive rat. *Biomed Pharmacol J.* 2014;7(1):137-42.
- 14- Gholamzadeh S, Zare S, Ilkhanipoor M. Anxiolytic effect of Echium amoenum during different treatment courses. *Res J Biol Sci.* 2008;3(2):176-8.
- 15- Abed A, Vaseghi G, Jafari E, Fattahian E, Babhadiashar N, Abed M. Echium Amoenum Fisch et mey: A review on its pharmacological and medicinal properties. *Asian J Med Pharm Res.* 2014;4(4):21-3.
- 16- Hosseini A, Sharatifar N. Effects of methanolic extract of Echium amoenum Fisch & Mey on seizure induced by picrotoxin in mice. *Horizon Med Sci.* 2004;10(2):20-5. [Persian]
- 17- Rabbani M, Sajjadi SE, Khalili S. A lack of tolerance to the anxiolytic action of Echium amoenum. *Res Pharm Sci.* 2011;6(2):101-6.
- 18- Abed A, Minaiyan M, Ghannadi A, Mahzouni P, Babavalian MR. Effect of Echium amoenum Fisch et mey a traditional Iranian herbal remedy in an experimental model of acute pancreatitis. *ISRN Gastroenterol.* 2012;2012:1-7.
- 19- Mahmoudi M, Shahidi S, Golmohammadi H, Mohammadi S. The effect of Echium amoenum hydro-alcoholic extract on blood glucose level, lipid profile and lipoproteins in streptozotocin-induced diabetic male

5HT_{1A} نقش مهمی در ایجاد اختلال اضطراب بازی می‌کند و این حقیقت که برخی آگونیست‌های گیرنده 5HT_{1A} داری خاصیت ضداضطرابی هستند، از این موضوع حمایت می‌کند.^[30] نشان داده شده است که در بیماران با اختلالات اضطرابی، رسپتورهای 5HT_{1A} در برخی از نواحی لیمبیک، پارالیمبیک، بخش جلویی کورتکس سینگولیت و بخش پشتی هسته رافه نسبت به افراد سالم کمتر است.^[31] همچنین نشان داده شده است اختلال اضطراب با پرکاری سیستم‌های نورادرنرژیک همراه است.^[32] لذا با عنایت به آنکه بوسپیرون به عنوان آگونیست گیرنده‌های 5HT_{1A} سروتونین، تعديل‌کننده فعالیت‌های دوپامینرژیک و نورادرنرژیک مغز نیز به حساب می‌آید.^[18] لذا اثرات ضداضطرابی آن قابل توجیه است.

با توجه به نتایج مطالعه حاضر و با عنایت به آنکه برخلاف بوسپیرون، گل گاوزبان فاقد اثرات جانبی مهم است، توصیه می‌شود که به منظور پیشگیری و درمان اضطراب از گل گاوزبان استفاده شود.

نتیجه‌گیری

بوسپیرون و عصاره گل گاوزبان هر دو باعث کاهش میزان اضطراب می‌شوند و اثر گل گاوزبان با افزایش دوره درمان بیشتر می‌شود.

تشکر و قدردانی: نویسنده‌گان مقاله بر خود واجب می‌دانند تا از همکاری‌های معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز که در انجام این پژوهش از هیچ کوششی درین نورزیدند، تقدیر و تشکر بنمایند.

تاییدیه اخلاقی: در تمام مراحل آزمایش، روش‌های استاندارد مریبوط به ملاحظات اخلاقی کار با حیوانات رعایت شد.

تعارض منافع: موردی از طرف نویسنده‌گان بیان نشده است.

منابع مالی: این پژوهش با حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام گرفته است

منابع

- 1- Sylvers P, Lilienfeld SO, LaPrairie JL. Differences between trait fear and trait anxiety: Implications for psychopathology. *Clin Psychol Rev.* 2011;31(1):122-37.
- 2- Drayer RA, Piraino B, Reynolds CF, Houck PR, Mazumdar S, Bernardini J, et al. Characteristics of depression in hemodialysis patients: Symptoms, quality of life and mortality Risk. *Gen Hosp Psychiatry.* 2006;28(4):306-12.
- 3- Strine TW, Chapman DP, Kobau R, Balluz L, Mokdad AH. Depression, anxiety, and physical impairments and quality of life in the U.S. no institutionalized population. *Psychiatr Serv.* 2004;55(12):1408-13.

- anxiety induced by elevated plus maze and the plasma corticosterone levels in adult male Wistar rats. *J Sabzevar Univ Med Sci.* 2015;22(4):557-64. [Persian]
- 27- Sayyah M, Sayyah M, Kamalinejad M. A preliminary randomized double blind clinical trial on the efficacy of aqueous extract of *Echium amoenum* in the treatment of mild to moderate major depression. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 2006;30(1):166-9.
- 28- Wu CF, Liu YL, Song M, Liu W, Wang JH, Li X et al. Protective effects of pseudoginsenoside-F11 on methamphetamine-induced neurotoxicity in mice. *Pharmacol Biochem Behav.* 2003;76(1):103-9.
- 29- Akimova E, Lanzenberger R, Kasper S. The serotonin-1A receptor in anxiety disorders. *Biol Psychiatry.* 2009;66(7):627-35.
- 30- Artigas F, Adell A, Celada P. Pindolol augmentation of antidepressant response. *Curr Drug Targets.* 2006;7(2):139-47.
- 31- Lanzenberger RR, Mitterhauser M, Spindelegger C, Wadsak W, Klein N, Mien LK, et al. Reduced serotonin-1A receptor binding in social anxiety disorder. *Biol Psychiatry.* 2007;61(9):1081-9.
- 32- Byers AL, Yaffe K, Covinsky KE, Friedman MB, Bruce ML. High occurrence of mood and anxiety disorders among older adults: The national comorbidity survey replication. *Arch Gen Psychiatry.* 2010;67(5):489-96.
- rats. *J Zanjan Univ Med Sci.* 2015;23(97):72-81. [Persian]
- 20- Velosa JF, Riddle MA. Pharmacologic treatment of anxiety disorders in children and adolescents. *Child Adolesc Psychiatry Clin N Am.* 2008;9(1):119-33.
- 21- Queiroz CM, Alcântara FB, Yagüe AM, Bibancos T, Frussa-Filho R. Acute buspirone abolishes the expression of behavioral dopaminergic supersensitivity in mice. *Braz J Med Biol Res.* 2002;35(2):237-42.
- 22- Czoty PW, Nader MA. Effects of oral and intravenous administration of buspirone on food-cocaine choice in socially housed male cynomolgus monkeys. *Neuropsychopharmacology.* 2015;40(5):1072-83.
- 23- Mohajel Nayebi A, Asadi M. Effect of buspirone on morphine withdrawal syndrome in mice. *Pharm Sci.* 2009;14(4):229-35. [Persian]
- 24- Eslami Shahrabaki M, Sabzevari L, Haghdoost A, Davari Ashtiani R. A randomized double blind crossover study on the effectiveness of buspirone and methylphenidate in treatment of attention deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. *Iran J Psychiatry Clin Psychol.* 2013;18(4):284-92.
- 25- Komaki A, Rasouli B, Shahidi S. Anxiolytic effect of *Borago officinalis* (boraginaceae) extract in male rats. *Avicenna J Neuro Psych Physio.* 2015;2(1):e27189.
- 26- Hosseini SE, Hamzavi S, Agh baba H. The effects of alcoholic extract of Red poppy (*Papaver rhoeas*) on

Comparison of the Effect of *Echium amoenum* with Buspirone on the Anxiety of Cruciate Maze in Adult Male Rats

Javid Z.¹ MSc, Hosseini S.E.* PhD

*Biology Department, Science Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

¹Psychology Department, Human Sciences Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

Abstract

Aims: Chemical compounds of *Echium amoenum* extract is effective in the treatment of anxiety. The present study was conducted with the aim of comparing the effect of aqueous extract of *Echium amoenum* with Buspirone which is widely used in treatment of anxiety disorders.

Materials & Methods: In this experimental study, 80 adult male rats were divided randomly into 2 parts of acute and chronic treatment each part with 5 groups (each 8 mice) including control (without treatment), sham (receiving sterilized water as drug solvent) and 3 experimental groups which received Buspirone, *Echium amoenum* hydroalcoholic extract and Buspirone+*Echium amoenum* hydroalcoholic extract. All treatments were performed for 7 days in acute and for 14 days in chronic group. Cruciate-maze test was used to measure anxiety and the time and frequency of rats' presence in the open and closed levers of the maze were recorded. Data were analyzed in SPSS 18 software using one-sided ANOVA and Tukey's statistical tests.

Findings: In acute groups, the means level of anxiety in *Echium amoenum* ($p<0.001$), Buspirone ($p<0.0001$) and Buspirone+*Echium amoenum* ($p<0.0001$) groups were reduced significantly compared to the control group, but the anti-anxiety effect of *Echium amoenum* was significantly less than Buspirone and Buspirone+*Echium amoenum*. In chronic groups, the means level of anxiety were reduced in all experimental groups compared to the control group ($p<0.0001$).

Conclusion: Buspirone and *Echium amoenum* extract both cause the reduction of anxiety level and the effect of *Echium amoenum* increase by increasing the time of treatment period.

Keywords

Buspirone [<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68002065>];

Echium [<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68036661>];

Anxiety [<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68001007>];

Rats [<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68051381>]

* Corresponding Author

Tel: +987143311148

Fax: +987143311172

Address: Science Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Kilometer 5 of Sadra Road, Shiraz, Iran
ebrahim.hossini@yahoo.com

Received: July 5, 2015

Accepted: November 14, 2015

ePublished: December 15, 2015